

حمل الآن

مجاناً وحصرياً

امتحانات رقم (1)

الترم الاول



امتحانات بعض مدارس المحافظات 2026



مديرية التربية والتعليم
إدارة الشروق

محافظة القاهرة

١

أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجة واحدة)

أولاً

١) مجموعة حل المعادلة : $|س| + ٢ = ١٢$ فى ح هى

- (أ) $\{٣، ٣-\}$ (ب) $\{٣، ٤-\}$ (ج) $\{٤، ٤-\}$ (د) $\{٢، ٢-\}$

٢) إذا تقاطع منحني الدالتين د (س) ، د^{-١} (س) فى النقطة (ل ، ٢ - ل) =

فإن : ل =

- (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

٣) إذا كانت د (س) = $\sqrt{٢س}$ ، م (س) = $س - ١$ فإن : (م ٥ د) = (٣) =

- (أ) ١ (ب) ٢ (ج) $٢\sqrt{٢}$ (د) ٣

٤) الدالة د (س) = $٣ - |س|$ تزايدية فى

- (أ) $٢، \infty$ (ب) $٠، \infty$ (ج) $٣، \infty$ (د) $٠، -\infty$

٥) إذا كان : $٣ = س(٢)$ فإن : $١ + س(٤) =$

- (أ) ٥ (ب) ٣٦ (ج) ١٢ (د) ٢٧

٦) إذا كان : لو س + لو س = ٢ فإن : س =

- (أ) ١٥ (ب) ٢٠ (ج) ٢٥ (د) ٥٠

٧) الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة د


فإن : نهـا د (س) =

- (أ) ١

- (ب) ١ -

- (ج) ٢

(د) ليس لها وجود.



٨) نهـا ٢ س ٢ س =
 س ←

(أ) صفر (ب) ١- (ج) ١ (د) ٤

٩) فى أى مثلث Δ ح يكون $\frac{٢}{٢} = \frac{٢}{٢}$
 س ←

(أ) ٢ نق (ب) ٦ نق (ج) ٤ نق (د) $\frac{٢}{٣}$ نق

١٠) إذا كان : ٢ ما = ٣ ما = ٤ ما فإن : ح : س =
 س ←

(أ) ٤ : ٣ : ٢ (ب) ٦ : ٤ : ٣ (ج) ٦ : ٣ : ٤ (د) ٣ : ٤ : ٦

١١) مساحة المثلث المتساوى الأضلاع الذى محيطه ١٨ سم تساوى سم
 س ←

(أ) $\sqrt{٤}$ (ب) $\sqrt{٦}$ (ج) $\sqrt{٩}$ (د) ٣٦

ثانياً أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجتين)

١٢) مجموعة حل المتباينة : $\sqrt{٢-٦س+٩} < ٢$ فى ح هى
 س ←

(أ) $[٥, ١]$ (ب) $]-٥, ١[$ (ج) $[٥, ١[$ (د) $]-٥, ١[$

١٣) مجموعة حل المعادلة : $٤س - ٢س + ١ = ٨$ فى ح هى
 س ←

(أ) $\{١, ٢\}$ (ب) $\{١, ٢\}$ (ج) $\{٢\}$ (د) $\{١\}$

١٤) إذا كان : لو_٣ لو_٣ (٣س + ٥) = ١ فإن : س =
 س ←

(أ) $\frac{٤}{٣}$ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

١٥) نهـا $\frac{٢(س-٢)}{٤س-٢} = \frac{٢(س-٢)}{٤س-٢}$
 س ←

(أ) ٢ (ب) $\frac{١}{٣}$ (ج) ٣ (د) $\frac{١}{٣}$

١٦) نهـا $\frac{٢}{س} \times \sqrt{٣س+٤} = \sqrt{٣س+٤}$
 س ←

(أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٨

١٧) نهـا $\frac{١٢٨ - ٧(٣-س)}{١٠-٢س} = \frac{١٢٨ - ٧(٣-س)}{١٠-٢س}$
 س ←


(أ) ٧ (ب) ٢٨ (ج) ٢٢٤ (د) ٤٤٨

١٨) فى Δ ح إذا كان : $٢ = (٢-٢) + ٣-٢$ فإن : ح (د) =°
 س ←

(أ) ٣٠ (ب) ٦٠ (ج) ٩٠ (د) ١٢٠

١٩ ارسم الشكل البياني للدالة $d(x) = x^2 + 2x + 5$ ومن الرسم أوجد المدى وابحث الاطراد ثم بين نوع الدالة من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك.

٢٠ ابحث اتصال الدالة d حيث $d(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + 5 & , x < 0 \\ x^2 - 2x + 5 & , x \geq 0 \end{cases}$ عند $x = 0$.



أولاً أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجة واحدة)

١ إذا كانت d دالة أحادية وكانت $d(x) = (x - 1)^2$ فإن $d(2) = \dots$

(أ) $\emptyset$ (ب) $\left\{\frac{2}{3}\right\}$ (ج) $\left\{\frac{1}{4}\right\}$ (د) $\left\{\frac{1}{4}, \frac{2}{3}\right\}$

٢ منحنى الدالة $d(x) = \frac{1}{x+3}$ يكون متماثلاً حول

(أ) المستقيم $x = 0$ (ب) النقطة $(0, 3)$
(ج) المستقيم $x = 0$ (د) النقطة $(0, 3)$

٣ مدى الدالة $d(x) = |x - 5|$ هو

(أ) $[-5, \infty)$ (ب) $[5, \infty)$ (ج) $[0, \infty)$ (د) $[-\infty, 0]$

٤ مجال الدالة $d(x) = \sqrt{\frac{1+x}{x-4}}$ يساوى

(أ) $[-1, \infty) - \{4\}$ (ب) $\{4\} - \mathbb{R}$
(ج) $[-1, \infty)$ (د) $\mathbb{R}$

٥ إذا كانت $d(x) = \sqrt{x+1}$ ، $r(x) = x+1$ فإن $(r \circ d)(7) = \dots$

(أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٨ (د) ٩

٦ إذا كان $u(x) = x^2$ ، $v(x) = x^3$ ، $w(x) = x^4$ ، $z(x) = x^5$ فإن $u(x) + v(x) + w(x) + z(x) = \dots$

(أ) ١٥ (ب) ٥٠ (ج) ٥٠ (د) ٢٠

٧) إذا كانت : د (س) = $4 - س$ فإن مجموعة حل المعادلة :

د (٢ - س) - ١٢ د (س - ١) - د (١) = صفر هي

- (أ) {٤} (ب) {١} (ج) {٠} (د) {١ ، ٠}

٨) مجموعة حل المعادلة : لو (س - ١) + لو (س + ١) = لو ٢٤ هي

- (أ) {٥} (ب) {٥ ، ٥} (ج) {٥ -} (د) {١ ، ٢٤}

٩) إذا كانت : د (س) = $س^٢ - ٢س + ١$ ، $س \leq ١$ فإن : د^{-١} (س) =

- (أ) $١ + س^٢$ (ب) $\sqrt{١ + س}$ (ج) $٢(١ + س)$ (د) $\sqrt{١ + س}$

١٠) نها = $\frac{٢٥ - س}{٢ - ١ - س}$

- (أ) ٤٠ (ب) ١٠ (ج) ٢٠ (د) ٦

١١) نها = $\frac{٤س + ٦س + ٤}{٢س + ٥س + ٣س}$

- (أ) $\frac{١٠}{٧}$ (ب) ٦ (ج) ٢ (د) ٥

ثانياً أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجتين)

١٢) نها = $\frac{٣١٢٥ - (٢ + س)^\circ}{٥س}$

- (أ) ٢٥ (ب) ١٢٥٠ (ج) ٦٢٥ (د) ٣١٢٥

١٣) نها = $\frac{٦ + س^٢}{٢(١ + س)}$

- (أ) ∞ (ب) ٦ (ج) ٣ (د) ١

١٤) إذا كان منحنى الدالة د يحتوى قفزة عند س = ١ فإن : نها = د (س)

- (أ) صفر (ب) ١ (ج) غير موجودة (د) د (١)

١٥) إذا كان : ٤ = ح مثلاً فيه : ٣ + ٤ = ١٨ سم ، و (د ح) = ٧٠°

، و (د ب) = ٤٠° فإن : أ سم

- (أ) ٧ (ب) ٥,٩ (ج) ٩,٥ (د) ١٣,٥

١٦ إذا كانت مساحة $\Delta ABC = 40$ سم² وطول نصف قطر الدائرة الخارجة له $= 10$ سم
فإن : ما (أ) ما (ب) ما (ج) ما (د) =

(أ) ٠, ٢ (ب) ٠, ١٥ (ج) ٠, ٤ (د) ٤٠

١٧ ΔABC مثلث محيطه $= 15$ سم فيه : $\hat{A} = 3$ سم ، $\hat{C} = 5$ سم
فإن قياس أكبر زواياه $=$ سم

(أ) ٣٠ (ب) ٦٠ (ج) ١٥٠ (د) ١٢٠

١٨ إذا كان ΔABC فيه : $\hat{A} = 10$ سم ، $\hat{C} = 15$ سم ، $\hat{B} = 80$
فإن محيط $\Delta ABC =$ سم

(أ) ١٦, ٥ (ب) ٣٩, ٤ (ج) ٤١, ٥ (د) ٣٤

ثالثاً الأسئلة المقالية

١٩ ارسم الشكل البياني للدالة د : د (س) = $\frac{س^2}{|س|}$ ومن الرسم عين المدى وابحث الاطراد
وحدد نوع الدالة من حيث الزوجية والفردية.

٢٠ إذا كانت الدالة د : د (س) = $\left. \begin{array}{l} \frac{س^3 + ٢س - ٣٦}{٣ - س} \\ ٣ \neq س \\ ٣ = س \end{array} \right\}$ ما (أ) ما (ب) ما (ج) ما (د) =

متصلة عند $س = 3$ أوجد قيمة : ؟



إدارة العامرية
توجيه العامرية

محافظة الإسكندرية

٣

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجة واحدة)

١ قياس أكبر زاوية في المثلث ΔABC الذي أطوال أضلاعه : ٣ سم ، ٥ سم ، ٧ سم
يساوى

(أ) ١١٠ (ب) ١٥٠ (ج) ١٠٠ (د) ١٢٠

٢ مجال الدالة د (س) = $\sqrt{١٧ - س}$ هو

(أ) $[-1, \infty)$ (ب) $[-1, \infty)$ (ج) $[-1, \infty)$ (د) $[-1, \infty)$

٣) إذا كانت : د (س) = س^٤ ما س فإنها تكون

(أ) زوجية. (ب) فردية.

(ج) زوجية وأحادية. (د) ليست زوجية وليست فردية.

٤) نقطة رأس المنحنى للدالة م (س) = |س - ٦| + ١ هي

(أ) (٦ ، ١) (ب) (٦ ، ١) (ج) (٦- ، ١) (د) (١- ، ٦)

٥) مجموعة حل المتباينة : $\sqrt{س^٢ - ٦س + ٩} < ١$ في ح هي

(أ) ح - [١ ، ٣] (ب) [٢ ، ٤] (ج) ح - [٢ ، ٤] (د) ح - [٢ ، ٤]

٦) إذا كانت : د (س) = ٥س فإن قيمة س التي تحقق العلاقة

د (س + ١) + د (س - ١) = ٢٦ هي

(أ) ٢ (ب) ١- (ج) ٤ (د) ١

٧) إذا كان : لو_٣ لو_٣ س = ١ فإن : س =

(أ) ٩ (ب) ٨ (ج) ٦ (د) ١

٨) نها $\lim_{س \rightarrow \infty} \frac{٩ - ٦س + ٥س^٢}{٣ - ٣س}$ + $\frac{١}{س^٥}$ =

(أ) ٢ (ب) ٢- (ج) ٨ (د) ٤

٩) نها $\lim_{س \rightarrow \infty} \frac{س^٢ + ٢س + ٣}{س^٢}$ =

(أ) ٦ (ب) ٨ (ج) ١٢ (د) ١١

١٠) مثلث ل م ه فيه : ل = ٤ ، ٨ سم ، م (د م) = ٧٥° ، ه (د م) = ٥٠°

فإن مساحة الدائرة المارة برؤوس المثلث ل م ه تساوى لأقرب سم^٢

(أ) ٨٣ (ب) ٧٠ (ج) ٣٢ (د) ٣٥

١١) إذا كان تق نصف قطر الدائرة الخارجة للمثلث س ص ع ، فإن : $\frac{ص}{٢ ما ص} = \dots\dots\dots$

(أ) تق (ب) ٢ تق (ج) ٠,٥ تق (د) ٤ تق

أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجتين)

ثانياً

١٣) إذا كان محيط الدائرة المارة برؤوس المثلث ABC $= 2\pi$ سم

فإن : $A + B + C = \dots$

- (أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ١

١٣) مجموعة حل المعادلة : $|2 - x| + |1 - x| = 0$ في x هي

- (أ) $\{2, -2\}$ (ب) $\{-2\}$ (ج) $\{2\}$ (د) $\emptyset$

١٤) إذا تقاطع منحني الدالتين d ، d^{-1} في النقطة $(2, 1)$ فإن : $d = \dots$

- (أ) ٤ (ب) $2 \pm$ (ج) $1 \pm$ (د) $2 \pm$

١٥) إذا كانت : d ، m دالتين حيث $d = (3 + x)(x)$ ، $m = (x - 2)(x)$

فإن : $(d \circ m)(2) = \dots$

- (أ) ٣ (ب) ٥ (ج) ٥- (د) ٢-

١٦) مجموعة حل المعادلة : $(x + 2) + (x - 2) = 1 - x$ لو x في x هي

- (أ) $\{2\}$ (ب) $\{2, -2\}$ (ج) $\{1, 2\}$ (د) $\{5\}$

١٧) إذا كانت : $f(x) = \frac{1 + x}{1 - x}$ ، $g(x) = \frac{x - 2}{x - 1}$ فإن : $f \circ g = \dots$

- (أ) ٣ (ب) ٢ (ج) $2 \pm$ (د) ١-

١٨) إذا كانت : $f(x) = \frac{1 - (x - 2)}{x - 1}$ فإن : $f = \dots$

- (أ) ٧ (ب) ٦ (ج) ١ (د) صفر

الأسئلة المقالية

ثالثاً

١٩) إذا كانت : $d = (x)$ $\left. \begin{array}{l} 3x^2 + x - 2 \text{ عندما } x < 2 \\ 16 \text{ عندما } x = 2 \\ 2x - 2 \text{ عندما } x > 2 \end{array} \right\}$

متصلة عند $x = 2$ أوجد قيمة $x + h$

٢٠) مثل بيانياً الدالة $d = (x)$ ومن الرسم أوجد مجال ومدى الدالة وابحث

أطرافها ونوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك.



أولاً أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجة واحدة)

١) جميع العلاقات الآتية تكون فيها ص دالة في ص ما عدا العلاقة

(أ) ص = ص + ١ (ب) ص = ص + ٢ (ج) ص = ص - ١ (د) ص = ص - ٢

(أ) ص = ص + ١ (ب) ص = ص + ٢ (ج) ص = ص - ١ (د) ص = ص - ٢

٢) نها $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^2 - 7x}{x^2 - 2x - 3} = \dots\dots\dots$

(أ) ٤٥ (ب) ٤٢ (ج) ١٥ (د) ١٤

٣) ص ص ع مثلث فيه : ٣ ص = ٤ ص = ٤ ص فإن ص : ص : ع =

(أ) ٤ : ٤ : ٣ (ب) ٤ : ٦ : ٣ (ج) ٤ : ٤ : ٣ (د) ٤ : ٣ : ٣

٤) الدالة الأحادية من بين الدوال المعرفة بالقواعد الآتية هي

(أ) د (ص) = ٧ (ب) د (ص) = ٣ + ص (ج) د (ص) = ص^٢ (د) د (ص) = ص

(أ) د (ص) = ٧ (ب) د (ص) = ٣ + ص (ج) د (ص) = ص^٢ (د) د (ص) = ص

٥) مجموعة حل المتباينة : $|٧ - ص| \leq ٣$ هي

(أ) $[-٢, ٥]$ (ب) $[١, ٢]$ (ج) $[٤, ٦]$ (د) $[٢, ٥]$

٦) إذا كانت : د (ص) = $\frac{١}{٣ - ص} + ١$ فإن مجال د^{-١} =

(أ) د - {٣} (ب) د - {٣-} (ج) د - {-١} (د) د - {١}

٧) إذا أزيح منحنى الدالة م : م (ص) = ص^٢ بمقدار ثلاث وحدات في الاتجاه السالب

لمحور الصادات فإنه يمثل منحنى الدالة د :

(أ) د (ص) = ص^٢ + ٣ (ب) د (ص) = (ص - ٣)^٢ (ج) د (ص) = ص^٢ - ٣ (د) د (ص) = (ص + ٣)^٢

(أ) د (ص) = ص^٢ + ٣ (ب) د (ص) = (ص - ٣)^٢ (ج) د (ص) = ص^٢ - ٣ (د) د (ص) = (ص + ٣)^٢

٨) إذا كانت د : د (ص) = (٢ - ص) دالة أسية فإن : ل $\exists \dots\dots\dots$

(أ) د - {٣} (ب) د - {٣} (ج) د - {٣} (د) د - {٣}

(أ) د - {٣} (ب) د - {٣} (ج) د - {٣} (د) د - {٣}

٩) نهـا $\frac{س^2 - ٥س + ٤}{س^2 - ١٦} = \dots\dots\dots$

(أ) $\frac{٣}{٨}$ (ب) $\frac{١}{٨}$ (ج) ٤ (د) ٨

١٠) إذا كان طول قطر الدائرة الخارجة عن المثلث Δ ح يساوى ٤ سم

فإن : $\frac{٢}{٢} = \dots\dots\dots$

(أ) ٢ (ب) ١ (ج) ٤ (د) $\frac{١}{٢}$

١١) Δ ح ص ع مثلث محيطه يساوى ٣١ سم ، $\angle$ (د ص) = ٥٠° ، $\angle$ (د ع) = ٦٠°

فإن : $\sin = \dots\dots\dots$ سم.

(أ) ١١ (ب) ١٢ (ج) ٩ (د) ١٠

ثانياً أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجتين)

١٢) إذا كانت : د (س) = $\sqrt{س}$ ، م (س) = $س^2$ وكانت : (م د) (س) = ٤

فإن : $\sin = \dots\dots\dots$

(أ) $١٦ \pm$ (ب) $٨ \pm$ (ج) $٢ \pm$ (د) ٨

١٣) إذا كان : لو $(\sqrt{س^2 + ١٠٠} + س)$ + لو $(\sqrt{س^2 + ١٠٠} - س)$ = لو ٣ لـ

فإن : لـ = $\dots\dots\dots$

(أ) ٣ (ب) ٩ (ج) $س^2$ (د) ١

١٤) إذا كانت : نهـا $\frac{١}{س} = \frac{٧ + س^2}{س^2 + ٣س + ٢}$ فإن : $\frac{٦ + ل}{١} = \dots\dots\dots$

(أ) ١ (ب) ٦ (ج) ٢ (د) ١ -

١٥) مثلث أطوال أضلاعه ٦ سم ، ١٠ سم ، ١٤ سم ، فإن مساحة المثلث = $\dots\dots\dots$ سم^٢.

(أ) $\sqrt[3]{١٥}$ (ب) $\frac{\sqrt[3]{١٥}}{٤}$ (ج) $\sqrt[3]{٧}$ (د) ١٥

١٦) نهـا $\frac{س}{س-١} = \frac{\pi س}{١-س}$ = $\dots\dots\dots$

(أ) $\frac{\pi}{٢}$ (ب) ١ (ج) π (د) $\pi -$

١٧) إذا كانت : د (س) = $\frac{لو(س+١٢)}{لو٣}$ وكانت : د^{-١} (٢) = ١٣ فإن : ب = $\dots\dots\dots$

(أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٥

١٨) إذا كانت : نهـا $\frac{6-(س)}{2-س}$ ϵ فإن : نهـا $\frac{6-(س)}{4-س}$
 (أ) ١ (ب) $\frac{1}{\epsilon}$ (ج) ٤ (د) ٨

ثالثاً الأسئلة المقالية

١٩) ارسم الشكل البياني للدالة د : د (س) = |س - ٣| ومن الرسم استنتج مدى الدالة ونوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك.

٢٠) إذا كانت : د (س) = $\left\{ \begin{array}{l} \frac{625 - \epsilon(5 + س)}{س} , س > ٠ \\ \frac{2}{\epsilon} , س = ٠ \\ \frac{٥٠٥ س}{س} , س < ٠ \end{array} \right.$ متصلة عند س = ٠

أوجد قيمة كل من : ٢ ، ٣



إدارة مشتول السوق

محافظة الشرقية

٥

أولاً أسئلة الاختبار من متعدد (كل سؤال بدرجة واحدة)

١) مدى الدالة د : د (س) = |س - ٢| + ٣ هو
 (أ) $]-\infty, ٢-]$ (ب) $]-\infty, ٢]$ (ج) $]-٣, \infty]$ (د) $]-٢, \infty]$
 ٢) إذا كانت : د ، س دالتين حيث د (س) = ٣س ، س (س) = ٣ - ٢س فإن : د (٢) =

(أ) ٣٦ (ب) ٢١ (ج) ٣٣ (د) ١٧

٣) نقطة تماثل منحنى الدالة د : د (س) = (١ - س)² هي

(أ) (١ - ، ٠) (ب) (٠ ، ١ -) (ج) (٠ ، ١) (د) (١ ، ٠)

٤) مجال الدالة د : د (س) = $\frac{5}{1-س}$ هو

(أ) $\{١\} - \mathbb{R}$ (ب) $]-\infty, ١]$ (ج) $]-\infty, ١[$ (د) $]-\infty, ١-]$

$$\dots\dots\dots = \frac{1}{40} + \frac{1}{40} + \frac{1}{40} \quad (5)$$

- (أ) 40 (ب) 1 (ج) 2 (د) صفر

(6) مجال الدالة د : د (س) = لو (2 - س) هو

- (أ) [0، 2) (ب) ح - {2} (ج) [2، ∞) (د) (-∞، 2]

$$\dots\dots\dots = \frac{1 - \text{نها} - \text{مأس}}{س} \quad (7)$$

- (أ) 2- (ب) $\frac{1}{3}$ (ج) $\frac{1}{4}$ (د) $\frac{3}{4}$

$$\dots\dots\dots = \frac{64 - س}{8 - س} \quad (8)$$

- (أ) 2 (ب) $\frac{3}{4}$ (ج) 8 (د) 6

(9) في Δ أ ب ح إذا كان : ح (د) = 4° ، 6° = 6 سم فإن : $\frac{س}{\text{مأ}} = \dots\dots\dots$ سم

- (أ) 3 (ب) 6 (ج) $\frac{1}{5}$ (د) 12

(10) في Δ أ ب ح إذا كان نق هو طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوسه

$$\dots\dots\dots = \frac{\text{ح}}{2 \text{ مأح}} \quad \text{فإن : سم}$$

- (أ) نق (ب) 2 نق (ج) $\frac{1}{4}$ نق (د) 4 نق

(11) قياس أكبر زوايا المثلث أ ب ح الذي أطوال أضلاعه 3 سم ، 5 سم ، 7 سم يساوى°

- (أ) 110 (ب) 150 (ج) 100 (د) 120

ثانياً أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجتين)

(12) إذا تقاطع منحنى الدالة د مع منحنى الدالة د⁻¹ في النقطة (ل ، 2 - ل) (ل ، 3 - ل) فإن : ل =

- (أ) 1 (ب) 3 (ج) -3 (د) -1

(13) مجموعة الحل للمعادلة : 3 - س + 1 - س - 3 = 24 في ح هي

- (أ) {3} (ب) {8} (ج) {صفر} (د) {2}

١٤ إذا كان : $(٤) ١ = ٣ - ٢٢ - ٢$ حيث $١ < ٢$ فإن : $٢ = \dots\dots\dots$

- (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

١٥ نهـ $\frac{١٥ + س - ٢}{٣ - س} = \dots\dots\dots$

- (أ) صفر (ب) ٢- (ج) ٥ (د) ليس لها وجود.

١٦ نهـ $\frac{١ - س}{٢ - ٣ + س} = \dots\dots\dots$

- (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

١٧ نهـ $\frac{١ + ٢ - س + ٣ - س}{٣ + ١ - س - ٢ - س} = \dots\dots\dots$

- (أ) ٢ (ب) $\frac{١}{٣}$ (ج) ٣ (د) $\frac{١}{٣}$

١٨ فى المثلث ٢ ح إذا كان : $\frac{٢}{٣} = \frac{٢}{٤} = \frac{٢}{٥}$ ومحيط المثلث ٢٤ سم

فإن مساحته تساوى سم.

- (أ) ٤٨ (ب) ٢٤ (ج) ١٢ (د) ٣٠

ثالثاً الأسئلة المقالية

١٩ ارسم منحنى الدالة د : $د (س) = (١ - س)$ ومن الرسم أوجد مدى الدالة وابحث

اطرادها وبين نوعها من حيث كونها زوجية أم فردية أم غير ذلك.

٢٠ إذا كانت الدالة د $(س) = \left. \begin{matrix} ٣ - س + ٢ - س + ١ - س \\ ٣ - س + ٢ - س + ١ - س \end{matrix} \right\}$ ، $٣ < س$ ، $٣ > س$ ،

وكانت نهـ $\frac{١}{٣} = (س) = ١٦$ فأوجد قيمة : $٢ + س$



إدارة بركة السبع
توجيه الرياضيات

محافظة المنوفية

٦

أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجة واحدة)

أولاً

١ إذا كانت : د $(س) = \sqrt{٣ - س}$ ، م $(س) = \sqrt{٣ - س}$ فإن مجال $(د + م) (س)$

هو

- (أ) $٣ ، \infty$ (ب) $٣ - ، \infty$ (ج) $٣ ، \infty - [$ (د) $\{٣\}$

٢) نقطة تماثل الدالة د (س) = $\frac{1}{1-s}$ هي
 (أ) (١، ١) (ب) (١، ١) (ج) (٠، ٠) (د) (١، -١)

٣) مجموعة الحل في ح للمتباينة: $|2س + 6| \geq 8$ هي
 (أ) ح - [٧، ١) (ب) {٦، ٢-} (ج) [١، ٧-] (د) [٨، ∞ -]

٤) مدى الدالة د (س) = $\frac{\sqrt{4س^2 - ٤س + ٤}}{٢ - س}$ هو
 (أ) ح (ب) {١، ١-} (ج) [١، ١-] (د) {١}

٥) في Δ أ ب ح إذا كان: ٤ ما أ ما ب = ٣ ما ب ما ح = ٥ ما ح ما أ
 فإن: أ : ب : ح =
 (أ) ٥ : ٤ : ٣ (ب) ٤ : ٥ : ٣ (ج) ١٥ : ١٠ : ٦ (د) ٤ : ٣ : ٥


٦) إذا كانت: نهـ $\frac{(٢ + س)س^٢ + ٦س + ١}{٣ - س٢}$ م فإن: (ل، م) =
 (أ) (٢، ٣-) (ب) (٢، ٣-) (ج) (٣، ٢-) (د) (٣، ٩)

٧) في Δ أ ب ح إذا كان: $\frac{أ}{ما أ} + \frac{ب}{ما ب} + \frac{ح}{ما ح} = ٢٤$ فإن طول قطر الدائرة الخارجة للمثلث أ ب ح =
 (أ) $٣\sqrt{٢}$ (ب) ٨ (ج) $٣\sqrt{٢}$ (د) ١٨

٨) لو س $\times$ لو س ص $= ٢$ لو س ص =
 (أ) ٦ (ب) ٤ (ج) ٢ س ص (د) ٤ س ص

٩) مجموعة الحل في ح للمعادلة: $(٢)س^١ + (٢)س^-١ = ١٠$ هي
 (أ) {٠} (ب) {١، ٠} (ج) {١} (د) {٢}

١٠) في الشكل المقابل:



أ ب ح، د ح هـ مثلثان متساويا الأضلاع

، $\exists \overline{ب هـ}$ ، $ب ح = ٨$ سم

، ح هـ = ٥ سم، $س هـ = ٦$ سم

فإن: س = سم.

(أ) $\frac{١}{٢}$

(ج) ٧

(ب) ٦

(د) ٥

$$\textcircled{11} \quad \text{نهـ} \frac{2-s}{1-s} = \dots\dots\dots$$

(أ) ليس لها وجود. (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) 2 (د) صفر

ثانياً أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجتين)

$$\textcircled{12} \quad \text{نهـ} \frac{s-8}{s-4} = \dots\dots\dots$$

(أ) 16 (ب) 12 (ج) 3 (د) $\frac{8}{3}$

$\textcircled{13}$ مجموعة الحل في ح للمعادلة : $(\text{لو} \text{ س})^2 - \text{لو} \text{ س}^2 = 4$ هي
 (أ) $\{25, 125\}$ (ب) $\{5, 625\}$ (ج) $\{125, 625\}$ (د) $\{1, 625\}$

$$\textcircled{14} \quad \text{نهـ} \frac{1-s}{5s} = \dots\dots\dots$$

(أ) ليس لها وجود. (ب) $\frac{1}{3}$ (ج) $\frac{1}{4}$ (د) صفر

$\textcircled{15}$ مساحة المثلث المحصور بين منحنى الدالة $d(s) = -|s| + 5$ ومحور السينات = وحدة مربعة.

(أ) 5 (ب) 10 (ج) 15 (د) 25

$\textcircled{16}$ إذا كان : ل ، م جذري المعادلة : $3s^2 + bs + 27 = \text{صفر}$
 فإن : لو₃ ل + لو₃ م =

(أ) 9 (ب) 6 (ج) 2 (د) 1

$$\textcircled{17} \quad \text{نهـ} \frac{s^2 + s - 40}{s - 2} = \dots\dots\dots$$

(أ) 92 (ب) 80 (ج) 6 (د) 35

$\textcircled{18}$ في ΔABC إذا كان : $(\hat{A})^2 + (\hat{B})^2 - (\hat{C})^2 = 3$ م $\hat{A}$ فإن : م $\exists$
 (أ) $[\frac{2}{3}, 0]$ (ب) $[\frac{2}{3}, 0]$ (ج) $[\frac{2}{3}, 0]$ (د) $[\frac{2}{3}, \frac{2}{3}]$

ثالثاً الأسئلة المقالية

$\textcircled{19}$ مثل منحنى الدالة الآتية مبيناً الاطراد والمدى ونوع الدالة من حيث كونها زوجية أو فردية :
 $d(s) = |s - 1| + 3$

$\textcircled{20}$ ابحث اتصال الدالة د : د (س) = $\left\{ \begin{array}{l} \frac{2s}{s} \\ s + 1 \end{array} \right\}$ عندما $s \neq 0$ عند $s = 0$ عندما $s = 0$



أُسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجة واحدة)

أولاً

- ١ إذا كان : $٤ - س - ٢ =$ صفر فإن قيم $س \in$
 (أ) $\{١\}$ (ب) $\{٢، ١\}$ (ج) $\{٢\}$ (د) $\{١ -\}$
- ٢ نقطة رأس المنحنى د : د (س) = $س^٢ + ٣$ هي
 (أ) $(٠، ٣)$ (ب) $(٣، ٠)$ (ج) $(٠، ٣ -)$ (د) $(٣ -، ٠)$
- ٣ إذا كانت : د (س) = $س^٢$ ، م (س) = $س + ٢$
 فإن : (م د) (س) هي دالة
 (أ) أحادية. (ب) فردية. (ج) زوجية. (د) خطية.
- ٤ إذا كان : $٣ - س = ٥$ فإن : $٣ + س^٢ =$
 (أ) ٥ (ب) ٧ (ج) ٤٥ (د) ٩٠
- ٥ Δ س ص ع فيه : $س = ٢٠$ سم ، $ع = ١٦$ سم ، $منا ص = \frac{٢}{٥}$
 فإن : ص = سم.
 (أ) ٢٠ (ب) ١٦ (ج) ٢٥ (د) ١٥
- ٦ طول نصف قطر الدائرة الخارجة للمثلث المتساوى الأضلاع الذى طول ضلعه $٨\sqrt{٣}$ سم
 يساوى سم.
 (أ) ٧ (ب) ٨ (ج) ٦ (د) ٤
- ٧ كل الدوال الآتية زوجية ما عدا
 (أ) د (س) = $س$ (ب) د (س) = $س^٢$ (ج) د (س) = $|س|$ (د) د (س) = $س + ١$
- ٨ مدى الدالة د : د (س) = $\frac{٢ - س}{٣ - س}$ هو
 (أ) $س$ (ب) $س - \{٣\}$ (ج) $س - \{٢\}$ (د) $\{٢\}$
- ٩ قياس أكبر زاوية فى المثلث الذى أطوال أضلعه ٣ سم ، ٥ سم ، ٧ سم يساوى°
 (أ) ٦٠ (ب) ٩٠ (ج) ١٢٠ (د) ١٥٠

١٠ نهـا $\frac{1-s}{1-s} = \dots\dots\dots$

- (أ) ١ (ب) ٥ (ج) ٦ (د) ٦

١١ نهـا $\frac{6+s-5-s}{9-s} = \dots\dots\dots$


- (أ) $\frac{1}{3}$ (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) $\frac{1}{5}$ (د) $\frac{1}{6}$

ثانياً أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجتين)

١٢ مجموعة حل المعادلة : $(2-s)(25-s) = \frac{4}{3}$ ٨١ في ح هي $\dots\dots\dots$

- (أ) $\{1\}$ (ب) $\{26\}$ (ج) $\{1, 26\}$ (د) $\emptyset$

١٣ في الشكل المقابل :



نهـا $\frac{1}{1-s} = \dots\dots\dots$

- (أ) ١

(ب) غير موجودة.

- (ج) ١-

- (د) ٢-

، $s \geq 1$
، $s < 1$

١٤ إذا كانت د دالة حيث $d(s) = \frac{2-s}{3-s-2}$

متصلة عند $s=1$ فإن : $\dots\dots\dots$

- (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ١- (د) ٢-

١٥ مجموعة حل المعادلة : لو $s + 9 = 1$ في ح هي $\dots\dots\dots$

- (أ) $\{1, 10\}$ (ب) $\{1\}$ (ج) $\{9\}$ (د) $\{1, 9\}$

١٦ نهـا $\frac{3-s}{5-s} = \dots\dots\dots$

- (أ) $\frac{9}{5}$ (ب) $\frac{3}{5}$ (ج) ٩ (د) $\frac{9}{5}$

١٧ مجموعة حل المتباينة : $|s-3| < 2$ في ح هي $\dots\dots\dots$

- (أ) $[1, 5]$ (ب) $[1, 5)$ (ج) $(-1, 5]$ (د) $[-1, 5)$

- ١٨) في Δ س ص ع إذا كان : $س^2 = ص^2 + ع^2 + ص ع$ فإن : $و (دس) = \dots^\circ$
- (أ) ١٢٠ (ب) ١٥٠ (ج) ٣٠ (د) ٦٠

ثالثاً الأسئلة المقالية

- ١٩) أوجد قيمة : نهـا $\frac{س^2 + ٥}{س(٢ + س^2)}$ $\leftarrow \infty$
- ٢٠) ارسم الشكل البياني للدالة $د(س) = ١ + \frac{١}{س-٢}$ ومن الرسم ابحث اطرافها.



إدارة بلقاس
توجيه الرياضيات

محافظة الدقهلية

٨

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجة واحدة)

- ١) في المثلث $أ ب ح$ إذا كان : $أ = ٥$ سم ، $ب = ٥\sqrt{٣}$ سم ، $ح = ١٠$ سم فإن جيب تمام أصغر زاوية فيه =
- (أ) $\frac{١}{٢}$ (ب) $\frac{\sqrt{٣}}{٢}$ (ج) ١ (د) صفر
- ٢) نهـا $\frac{س^3 + س + ١}{س^2 + ١}$ $\leftarrow \infty$ =
- (أ) ١ (ب) $\frac{٢}{٢}$ (ج) ٢ (د) صفر
- ٣) في Δ $أ ب ح$ إذا كان : $أ^2 = ب^2 + ح^2 + ب ح$ فإن : $و (دح) = \dots^\circ$
- (أ) ٣٠ (ب) ٤٥ (ج) ٦٠ (د) ١٢٠
- ٤) منحنى الدالة $د(س) = |١ + س|$ متماثل حول المستقيم
- (أ) $س = ١$ (ب) $س = -١$ (ج) $س = ٢$ (د) $س = -٢$
- ٥) مجموعة حل المعادلة : $|٢ - س| = ٢ - س$ في $ح$ هي
- (أ) $ح$ (ب) $[٢, \infty)$ (ج) $[-٢, \infty)$ (د) $ح - \{٢\}$
- ٦) نهـا $\frac{س + ١}{س} \leftarrow \pi$ =
- (أ) صفر (ب) ١ (ج) $\frac{\pi}{٢}$ (د) $\frac{٢}{\pi}$
- ٧) نهـا $\frac{١ + ٢س + ٣س^2}{س} \leftarrow \infty$ =
- (أ) صفر (ب) ١ (ج) ∞ (د) $\infty -$

٨) مجال الدالة د (س) = $\frac{1}{\sqrt{2س-9}}$ هو

(أ) $]-3, 3[$ (ب) $]-3, 3[$ (ج) $]-3, 3[$ (د) $]-3, 3[$

٩) مدى الدالة د : د (س) = $5 - س$ هو

(أ) $]-5, 0[$ (ب) $]-5, 0[$ (ج) $]-5, 0[$ (د) $]-5, 0[$

١٠) مجموعة حل المعادلة : $\sqrt{2س-16} = 16$ في ح هي

(أ) $\{4\}$ (ب) $\{8, -8\}$ (ج) $\{64\}$ (د) $\{-64, 64\}$

١١) إذا كان : لو $2 = 4$ ، لو $3 = 5$ فإن : لو $18 =$

(أ) $2 + 4$ (ب) $2 + 4$ (ج) $4 + 2$ (د) $2 + 4$

ثانياً أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجتين)

١٢) إذا كانت : ح (س) = $3س$ فإن مجموعة حل المعادلة :

$ح(2س) - ح(س + 1) = 0$ هي

(أ) $\{0\}$ (ب) $\{1, 0\}$ (ج) $\{1\}$ (د) $\{-1\}$

١٣) إذا كانت : نه $\frac{23س^2 - 4س + 2}{5س^2 + 2س(1-4) + 2} = 2$ فإن : $4 =$

(أ) $2 -$ (ب) 2 (ج) $\frac{1}{2}$ (د) $\frac{1}{2}$

١٤) إذا كانت الدالة د (س) = $\frac{2-3+س}{1-س}$ ، $س \neq 1$ ، $س = 1$ ،

متصلة عند $س = 1$ فإن : قيمة $4 =$

(أ) $\frac{1}{4}$ (ب) $\frac{2}{4}$ (ج) $\frac{1}{4}$ (د) 4

١٥) مجال الدالة د (س) = $لوس - 10$ هو

(أ) $]-2, +\infty[$ (ب) $]-2, +\infty[$ (ج) $]-2, +\infty[$ (د) $]-2, +\infty[$

(أ) $]-2, +\infty[$ (ب) $]-2, +\infty[$ (ج) $]-2, +\infty[$ (د) $]-2, +\infty[$

$$16) \text{ نهـ } \frac{3 - \sqrt{9 + 2x}}{x + 2} = \dots\dots\dots$$

- (أ) $\frac{1}{3}$ (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) 2 (د) $3 -$

17) إذا كان محيط الدائرة الخارجة عن ΔABC يساوي 6π

$$\text{فإن : } \frac{AB}{AC + BC} = \dots\dots\dots$$

- (أ) 2 (ب) 64 (ج) 8 (د) 216

18) إذا كانت f دالة فردية وكان : $f(x) + f(x^2) = 2$

$$\text{فإن : } f(2) = \dots\dots\dots$$

- (أ) $\frac{1}{3}$ (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) $\frac{1}{5}$ (د) $\frac{1}{6}$

ثالثاً الأسئلة المقالية

19) مثل بياناً الدالة $f(x) = \frac{x^2 - 5}{x - 2}$ موضعاً المدى ونوع الدالة من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك.

20) إذا كانت الدالة $f : D \rightarrow R$: $f(x) = \begin{cases} 4 - x, & x \geq 1 \\ x + 1, & 1 < x < 3 \\ 2 - x, & x \leq 2 \end{cases}$ متصلة على C فأوجد قيمتي $f(2)$ ، $f(3)$



إدارة فايد
توجيه الرياضيات

محافظة الإسماعيلية

٩

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجة واحدة)

$$1) \text{ نهـ } \frac{x^2 - 1}{1 - 2x} = \dots\dots\dots$$

- (أ) صفر (ب) 3 (ج) 2 (د) 1

2) مجموعة حل المعادلة : $(\sqrt{3})^{|x+4|} - 9 = 0$ في C هي

- (أ) $\{0, -8\}$ (ب) $\{2, 6\}$ (ج) $\{2, 6\}$ (د) $\{0, 8\}$

3) إذا كانت النقطة $(8, 4) \in$ بيان الدالة $f : D \rightarrow R$ = لوم x

$$\text{فإن : قيمة } f = \dots\dots\dots$$

- (أ) $2 -$ (ب) 4 (ج) 3 (د) 5

④ مجال الدالة د : د (س) = $\frac{س}{\sqrt{3-س}}$ هو

(أ) $]-\infty, 3[$ (ب) $]3, \infty[$ (ج) $]-2, \infty[$ (د) $]2, \infty[$

⑤ أى من الدوال الآتية أحادية ؟

(أ) د (س) = $\frac{2+س}{1-س}$ (ب) د (س) = $طاس$
(ج) د (س) = $ماس$ (د) د (س) = $|2+س|$

⑥ أى من الدوال الآتية ليس لها دالة عكسية ؟

(أ) ص = $\frac{1}{3}س$ (ب) ص = $2س$
(ج) ص = $لو س$ (د) ص = $2(2-س)$

⑦ إذا كانت : د (س) = $2س - 5$ ، م (س) = $ماس$

فإن : د (م) = $\left(\frac{\pi}{6}\right)$

(أ) $-\frac{1}{4}$ (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) $-\frac{3}{4}$ (د) $\frac{3}{4}$

⑧ Δ أ ب ح فيه : أ = ٤ ، ب = ٣٥ سم ، ح = ٣٠° ، وطول نصف قطر الدائرة المارة

برؤوسه ١٤ سم فإن : ما =

(أ) $\frac{1}{4}$ (ب) $\frac{3}{7}$ (ج) $\frac{3}{4}$ (د) $\frac{3}{5}$

⑨ Δ أ ب ح فيه : أ = ٢ سم ، ب = ٤ $\sqrt{2}$ سم ، ح = ٢ $\sqrt{13}$ سم

فإن قياس أكبر زاوية فيه =

(أ) $\frac{1}{3}\pi$ (ب) $\frac{2}{3}\pi$ (ج) 60° (د) 135°

⑩ Δ أ ب ح فيه : ما = (٢ - ح) ، ماب = ١٤ $\sqrt{2}$ سم فإن طول نصف قطر الدائرة

المارة برؤوسه = سم.

(أ) $4\sqrt{2}$ (ب) ٥ (ج) ٨ (د) ١٤


⑪ الشكل المقابل يمثل

الشكل البياني للدالة د (س)

فإن : نهـا د (س) =

(أ) صفر (ب) ١

(ج) ٢ (د) ليس لها وجود.



ثانياً أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجتين)

١٢) نهـا $\frac{4-s}{3-s+5} = \dots\dots\dots$

- (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٦ (د) ٤

١٣) نهـا $\frac{5+s^2}{3+s^2} - \frac{6+s^2}{2+s^2} = \dots\dots\dots$

- (أ) صفر (ب) ٣ (ج) ٢ (د) ٤

١٤) إذا كانت : نهـا $\frac{1}{s} = 2$ فما $s = 4$ فإن : $\dots\dots\dots = 4$

- (أ) ٣ (ب) $3 \pm$ (ج) ٢ (د) $2 \pm$

١٥) مجموعة حل المعادلة : $s^3 - 2 = s^3 - 13$ في s هي $\dots\dots\dots$

- (أ) $\{1\}$ (ب) $\{0\}$ (ج) $\{3\}$ (د) $\{1, 0\}$


١٦) إذا كان مجال الدالة $d : (s) = \frac{s+1}{s^2+4s+4}$ هو $\dots\dots\dots$ فإن : $\dots\dots\dots$

- (أ) $1 < s$ (ب) $1 < s < 1$ (ج) $1 > s$ (د) $1 > s$

١٧) إذا كان : $لو_٧ \times ٣ \times لو_٧ \times ٨ = لو_٧$ فإن : $s = \dots\dots\dots$

- (أ) ١٠ (ب) ٢ (ج) ١٠٠ (د) ١٠٠٠

١٨) في الشكل المقابل :



s ص s ع مثلث فيه : $s : ص : ع = 8 : 3 : 7$

، $س \perp ص ع$ ، $س ل = 3\sqrt{3}$ سم

فإن : طول $س ص = \dots\dots\dots$ سم

- (أ) ٦ (ب) ١٢ (ج) ١٤ (د) ١٦

ثالثاً الأسئلة المقالية

١٩) ارسم الشكل البياني للدالة $d (s) = s^2 - |s| - 3$ ثم استنتج مدى الدالة واطرادها ونوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك.

٢٠) ابحث اتصال الدالة : $d (s) = \left\{ \begin{array}{l} \frac{s^2 + 2s}{s} \\ 2 + s^3 \end{array} \right.$ حيث $s < 0$ عند $s = 0$ حيث $s \geq 0$



أولاً أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجة واحدة)

- ١) نقطة تماثل منحنى الدالة $d : (س) = س^2 + ١$ هي
 (أ) $(٠, ١)$ (ب) $(٠, -١)$ (ج) $(٠, ١)$ (د) $(١, ٠)$
- ٢) في Δ $أب = ٦$ ح إذا كان : $أ = ٦$ ما فإن طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوسه يساوى سم.
 (أ) ١٢ (ب) ١٨ (ج) ٣ (د) ٦
- ٣) مجموعة حل المتباينة : $|س - ١| \geq ٣$ فى ح هي
 (أ) $[٢, ٤]$ (ب) $\{٢, ٤\}$ (ج) $[٢, ٤]$ (د) $ح - [٢, ٤]$
- ٤) إذا كانت : نهـ $س = \frac{٣ + س}{٧ - س}$ فإن : $أ =$
 (أ) ٥ (ب) ٧ (ج) ١٠ (د) ٢
- ٥) مجموعة حل المعادلة : لو $س = (١٢ + س)$ فى ح هي
 (أ) $\{٤\}$ (ب) $\{٣, ٤\}$ (ج) $\{٣\}$ (د) $\{٣\}$
- ٦) إذا كان : لو $(٢ - س - ٥) =$ صفر فإن : $س =$
 (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٦ (د) ٥
- ٧) نهـ $س = \frac{٣٢ - س}{٤ - س}$
 (أ) ٥ (ب) ١٠ (ج) ٢٠ (د) ١٥
- ٨) إذا كانت : $د (س) = س^2$ ، $س (س) = ٢ + س + ١$ فإن : $د (س) = (١) =$
 (أ) ٦ (ب) ٢٧ (ج) ٩ (د) ١٢
- ٩) مثلث أطوال أضلاعه هي ١٠ سم ، ١٤ سم ، ٦ سم
 فإن قياس أكبر زاوية من زواياه =
 (أ) ١٥٠ (ب) ١٢٠ (ج) ٦٠ (د) ٣٠

١٠) في Δ ا ب ح إذا كان : $\hat{A} = 6^\circ$ سم ، $\hat{C} = 9^\circ$ سم ، $\hat{B} = 120^\circ$ (د ح) = 120°

فإن : ح = سم.

(أ) $\sqrt{19}$ (ب) $\sqrt{17}$ (ج) $\sqrt{21}$ (د) $\sqrt{15}$

١١) إذا كانت : د (س) = $\sqrt[3]{س}$ فإن : د^{-١} (س) =

(أ) $\frac{1}{4}$ (ب) $\frac{1}{3}$ (ج) $\frac{1}{2}$ (د) $\frac{1}{4}$ س

ثانياً أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجتين)

١٢) مدى الدالة د : د (س) = (س - ٤) + ٣ هو

(أ) $[-\infty, 4]$ (ب) $[-4, \infty]$ (ج) $[-3, \infty]$ (د) $[-\infty, 3]$

١٣) إذا كانت : س = $\frac{5}{3}$ ٢٤٣ فإن : س =

(أ) ٢٧ (ب) ٩ (ج) ٨١ (د) ٣

١٤) إذا كانت : ٢ س + ص = ١٢٨ ، وكانت : س = ٣ فإن : ص =

(أ) ٧ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ٣

١٥) نه = $\frac{٩ - س}{٣ - س}$ ١ ← س =

(أ) ٣ (ب) ٦ (ج) ٩ (د) ١٢

١٦) في Δ ا ب ح إذا كان : $\hat{A} = 10^\circ$ سم ، $\hat{C} = 30^\circ$ ، $\hat{B} = 45^\circ$

فإن : ح = سم

(أ) ١٤, ١ (ب) ١٦, ٢ (ج) ١٨, ٥ (د) ١٩, ٣

١٧) نه = $\frac{٢ س + ٣ س}{٥ س + ٢ س}$ ١ ← س =

(أ) ١ (ب) $\frac{5}{7}$ (ج) $\frac{5}{7}$ (د) ١ -

١٨) نه = $\frac{١٢ + س - ٧ - ٢ س}{٤ - س}$ ١ ← س =

(أ) ١ (ب) ٧ (ج) ١ - (د) ١٢

١٩ ارسم الشكل البياني للدالة د : $(س) = |س - ٢|$ ، ومن الرسم عين مجال الدالة وابحث اطرادها.

٢٠ ابحث اتصال الدالة د : $(س) = \begin{cases} ٣س + ٤ ، س > ٣ \\ ٣س - ٢ ، س \leq ٣ \end{cases}$ عند $س = ٣$



إدارة شبراخيت
توجيه الرياضيات

محافظة البحيرة

١١

أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجة واحدة)

أولاً

١ محور تماثل د $(س) = |س + ١| + ٢$ هو المستقيم الذى معادلته

(أ) $س = ١$ (ب) $س = -١$ (ج) $س = ٢$ (د) $س = -٢$

٢ إذا كان : لو $٣ = س$ ، لو $٢ = ص$ فإن : لو $٦ =$

(أ) $س - ص$ (ب) $س ص$ (ج) $\frac{س}{ص}$ (د) $س + ص$

٣ إذا كان : $\sqrt[٣]{س} = ٤$ فإن : $س =$

(أ) ± ٤ (ب) ± ٨ (ج) ٤ (د) ٨

٤ إذا كانت د دالة زوجية فإن : د $(٥) - د (٥) =$

(أ) صفر (ب) د (٥) (ج) د $٢ (٥)$ (د) د (١٠)

٥ منحنى الدالة م $(س) = (س + ٣)^٢$ هو نفس منحنى الدالة د $(س) = س^٢$

بإزاحة قدرها ٣ وحدات فى اتجاه

(أ) و $\overleftarrow{س}$ (ب) و $\overrightarrow{س}$ (ج) و $\overleftarrow{ص}$ (د) و $\overrightarrow{ص}$

٦ إذا كانت : د $(س) = \sqrt[٣]{١ - س}$ ، م $(س) = س^٢ + ٢$ فإن : (م د) $(٣) =$

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٤ (د) ٦

٧ فى Δ س ص ع إذا كانت : $س = ٥$ سم ، $ص = ٣$ سم ، $ع = \frac{١}{٢}$

فإن : $ع =$ سم.

(أ) ٧ (ب) ٤٩ (ج) $\sqrt[٧]{٢}$ (د) ٨

$$\textcircled{8} \quad \frac{8 - 2s}{6 + s} = \frac{2 - s}{5 - 2s} \quad \text{نهيا} \quad \frac{2 - s}{5 - 2s} = \dots$$

(أ) صفر (ب) ٢- (ج) ليس لها وجود. (د) ١٢-

$$\textcircled{9} \quad \frac{9}{\infty - s} = (5 + 1 - s + 9 + 2 - s) \quad \text{نهيا} \quad \frac{9}{\infty - s} = \dots$$

(أ) ٩ (ب) صفر (ج) ٥ (د) ٤

١٠) في أى مثلث Δ ح العبارة الصحيحة هي

$$\textcircled{11} \quad \frac{a}{c} = \frac{A}{C} \quad \text{(أ)} \quad \frac{a}{c} = \frac{A}{C} \quad \text{(ب)}$$

$$\textcircled{11} \quad \Delta \text{ ح فيه : } 9 = \text{سم} , 15 = \text{سم} , 12 = \text{سم} \quad \text{(أ)} \quad 9 = \text{سم} , 15 = \text{سم} , 12 = \text{سم} \quad \text{(ب)}$$

١١) Δ ح فيه : $9 = \text{سم} , 15 = \text{سم} , 12 = \text{سم}$

فإن قياس أكبر زاوية فيه =

(أ) ٦٠ (ب) ٩٠ (ج) ١٠٠ (د) ١٢٠

ثانياً أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجتين)

١٢) م. ح المتباينة : $|2 - s| \leq 3$ فى ح هي

$$\textcircled{12} \quad \text{م. ح المتباينة : } |2 - s| \leq 3 \quad \text{فى ح هي } [0, 1] \quad \text{(أ)}$$

$$\textcircled{12} \quad \text{م. ح المتباينة : } |2 - s| \leq 3 \quad \text{فى ح هي } [0, 1] \quad \text{(ب)}$$

١٣) إذا كانت : $2 = s$ ، $3 = s$ ، $8 = s$ فإن : $s = \dots$

(أ) ٣- (ب) ٤ (ج) ٣ (د) ٨١

١٤) م. ح المعادلة : $1 = (2 - s)$ فى ح هي

$$\textcircled{14} \quad \text{م. ح المعادلة : } 1 = (2 - s) \quad \text{فى ح هي } \{2\} \quad \text{(أ)}$$

$$\textcircled{14} \quad \text{م. ح المعادلة : } 1 = (2 - s) \quad \text{فى ح هي } \{2\} \quad \text{(ب)}$$

$$\textcircled{15} \quad \text{إذا كانت : د (س) } = \left\{ \begin{array}{l} 4 - s - 1 , \quad s < 2 \\ 3 + s - 1 , \quad s \geq 2 \end{array} \right\}$$

فإن : نهيا د (س) =

(أ) ٨ (ب) ٧ (ج) ٣ (د) ليس لها وجود.

١٦ نهيا $\frac{3 - \sqrt{1 - 2s}}{20 - 2s} = \dots\dots\dots$

(أ) ٣٠ (ب) $\frac{1}{3}$ (ج) $\frac{1}{3} -$ (د) $\frac{1}{5}$

١٧ في Δ $4 - 2 - 2 + 2 = 0$ فإن : و (د ح) = 0°

(أ) ٣٠ (ب) ١٥٠ (ج) ٦٠ (د) ١٢٠

١٨ إذا كانت : د (س) = $\left. \begin{array}{l} 4 - 2 - 2 + 2 \\ 4 - 2 - 2 + 2 \end{array} \right\}$ عند س $\neq 3$ متصلة عند س = ٣

فإن : ٢ = $\dots\dots\dots$

(أ) ٣- (ب) ٣ (ج) ٩ (د) ١٢

ثالثاً الأسئلة المقالية

١٩ ارسم الشكل العام للمنحنى د (س) = $\frac{1}{1 - s} + 2$ موضحاً مدى الدالة ونوعها

من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك.

٢٠ أوجد موضحاً خطوات الحل قيمة : نهيا $\frac{32 - s}{16 - s} = \frac{2 + 6 - s}{16 - s}$



إدارة أبشواى
توجيه الرياضيات

محافظة الفيوم

١٢

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجة واحدة)

١ مجال الدالة د : د (س) = $\sqrt{3 - s}$ هو $\dots\dots\dots$

(أ) $[-3, \infty)$ (ب) $[-3, \infty]$ (ج) $[-3, \infty)$ (د) $[-3, \infty]$

٢ إذا كانت : (١، -٤) هى نقطة تماثل منحنى الدالة د (س) = $\frac{1}{s - 2} - 4$

، $\exists c, \exists c$ فإن : $b + c = \dots\dots\dots$

(أ) ٣- (ب) صفر (ج) ٤ (د) ٥

٣) إذا كانت : د (س) = $س^2$ ، م (س) = $س - ٢$ فإن : (د م) (س) تكون دالة

(أ) أحادية. (ب) فردية. (ج) زوجية. (د) خطية.

٤) مجموعة حل المتباينة : $(|٤س - ٦| - |٢س^٢ - ١٢س + ٩|) \geq ٥$ في ح هي

(أ) ح - [٤ ، ١] (ب) ح - [١ ، ٤]

(ج) ح - [١ ، ٤] (د) ح - [٤ ، ١]

٥) مجموعة حل المعادلة : $(لوس)^٢ - لوس + ٢ = ٠$ صفر في ح هي

(أ) {١٠ ، ١٠٠} (ب) {١ ، ١٠}

(ج) {صفر ، ١٠} (د) {١٠ ، ١٠٠}

٦) إذا كان : $س^{\frac{٥}{٣}} = \sqrt[٣]{٣٢}$ فإن : س =

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) $٢ \pm$ (د) ٣

٧) نهـ = $\frac{٢٧ - س^٢}{٣ - س}$ س =

(أ) ٣ (ب) ٩ (ج) ٢٧ (د) ٨١

٨) نهـ = $\frac{٢س^٤ - ٥س^٧ - ٤}{٣ + س^٢ - ٧}$ س =

(أ) $\frac{٤}{٣}$ (ب) $\frac{٣}{٤}$ (ج) صفر (د) $\frac{٤}{٣}$

٩) إذا كانت مساحة المثلث أ ب ح = ١٥ سم^٢ فإن : (ب^٢ + ح^٢ - أ^٢) ط أ =

(أ) ١٥ (ب) ٣٠ (ج) ٤٥ (د) ٦٠

١٠) أ ب ح د شكل رباعي دائري فإن : م أ + م ب ح =

(أ) ١ (ب) ١- (ج) ٢ (د) صفر

١١) في أي مثلث أ ب ح يكون : $\frac{م ا (ب + ح)}{م ا ب + م ا ح} =$

(أ) ١ (ب) $\frac{ب}{أ + ح}$ (ج) $\frac{أ}{ب + ح}$ (د) $\frac{ح}{أ + ب}$

ثانياً أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجتين)

١٢) الدالة العكسية للدالة : $ص = ٣ - س - ٥$ هي

(أ) $ص = س + ٥$ (ب) $ص = ٣ - س$

(ج) $ص = \frac{1}{٥} (س + ٣)$ (د) $ص = \frac{1}{٣} (س + ٥)$

١٣) إذا كانت : د (س) = $٣ - س$ فإن قيمة س التي تحقق : د (س + ١) + د (س - ١) = ٩٠ هي

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٢ -

١٤) مستطيل بعده : لو ٢ سم ، لو ٣٢ سم فإن محيطه = سم.

(أ) ٢ لو ٨ (ب) ٢ لو ٤٨ (ج) ٦ (د) ١٢

١٥) نهـ = $\frac{س ما ٣ + س ما ٢}{س ما ٥ - س ما ٢}$ س ← صفر

(أ) ١ (ب) ٧ (ج) ٦ (د) غير موجودة.

١٦) نهـ = $\frac{س - ٥\sqrt{١ + س} + ٤}{١ - \sqrt{١ + س}}$ س ← ١

(أ) ١ (ب) ٣ - (ج) ١٦ (د) $٢\sqrt{٢}$

١٧) نهـ = $\frac{س^٥ - س^٣ - ٢٤}{٢ - س}$ س ← ٢

(أ) ٨ (ب) ٩٢ (ج) ٦٨ (د) ٤٨

١٨) نهـ = $\frac{٧ - م}{٣ - ٢ + م\sqrt{٧}}$ م ← ٧

(أ) ١,٥ (ب) ٦ (ج) ٩ (د) ٠,٦٦

ثالثاً الأسئلة المقالية

١٩) ارسم منحنى الدالة د : د (س) = $\left\{ \begin{array}{l} ١ - س^٢ , س \geq ٢ \\ ١ + س , س < ٢ \end{array} \right.$

ومن الرسم أوجد مداها واطرادها.

٢٠) ابحث اتصال الدالة : د (س) = $\left\{ \begin{array}{l} \frac{١ - س ما ٣ + س ما ٢}{س} , س > صفر \\ ٣ - س ما ٣ , س \leq صفر \end{array} \right.$

عند س = صفر

٩) في المثلث ABC : $\angle C = 47^\circ$ ، $\angle D = 66^\circ$ ، محيط المثلث $= 75$ سم
فإن : $\angle C = \dots\dots\dots$ سم.

- (أ) ٢٢ (ب) ٢٧ (ج) ١٦ (د) ٣٠

١٠) في ΔABC يكون $\angle C$ (أ) $\angle A + \angle B = \dots\dots\dots$

- (أ) 4° (ب) 2° (ج) 2° (د) 2°

١١) مثلث ABC متساوي الساقين فيه : $\angle D = 120^\circ$ ، طول قطر الدائرة المارة
برؤوسه 42 سم فإن : $\angle C = \dots\dots\dots$

- (أ) ٢١ سم (ب) ١٢ سم (ج) ٤ سم (د) ٨٤ سم

ثانياً أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجتين)

١٢) إذا كان : $2 = (2 + x)$ فإن مجموعة حل المعادلة $= \dots\dots\dots$

- (أ) $\{1, 2\}$ (ب) $\{2, -2\}$ (ج) $\{1\}$ (د) $\{2\}$

١٣) مجموعة حل المتباينة : $2x + 5 \leq 3$ هي $\dots\dots\dots$

- (أ) $\emptyset$ (ب) $[-2, -1]$ (ج) $[-1, 1]$ (د) $[-1, 1]$

١٤) إذا كان : $3x^2 = (9x^2 - 12x + 3)^2$ فإن مجموعة حل المعادلة $= \dots\dots\dots$

- (أ) $\{1, 2\}$ (ب) $\{2, -2\}$ (ج) $\{1\}$ (د) $\{2, -2\}$

١٥) إذا كانت : $\frac{3x^2 + 2x + 1}{1 - x^2} = 3$ فإن : $x + m = \dots\dots\dots$

- (أ) ٤ (ب) ٥ (ج) ٨ (د) ٩

١٦) إذا كانت : $D = (x) = \left\{ \frac{9 - x^2}{2 - x} \right\} = \left\{ \frac{9 - x^2}{2 - x} \right\}$ ، $x \neq 3$ ، متصلة عند $x = 3$ ، $x = 3$ ، 22

فإن : العدد $2 = \dots\dots\dots$

- (أ) ٢ (ب) $\frac{2}{3}$ (ج) ٣ (د) ٢

$$١٧) \text{ نهـا} = \frac{(١ - \text{هـا})}{٢} \times (\text{هـا} + ١) = \dots\dots\dots$$


٣ (د)

٢ (ج)

١ (ب)

٠ (أ) صفر

١٨) في الشكل المقابل :



أ ب ح د شكل رباعي فيه : ب = ٩ = ٨ سم

$$١٩) \text{ ، } \text{و (د ب ع)} = ٨٦^\circ \text{ ، } \text{و (د أ ب ع)} = ٤٤^\circ$$

، $\overline{\text{أ ب}} \parallel \overline{\text{ب ح}}$ فإن : طول $\overline{\text{د ح}} = \dots\dots\dots$ سم .

٨ (ب)

١٠ (أ)

١٢ (د)

٦ (ج)

الأسئلة المقالية

ثالثاً

٢٠) ارسم منحنى الدالة د (س) = ٤ - (س - ١)² ومن الرسم حدد نوع الدالة زوجية أم

فردية أم غير ذلك وابحث اطراف الدالة .

$$٢١) \text{ أوجد : نهـا} = \frac{٣ - ٢ - ٥ + ٦}{٢ - ٣} = \dots\dots\dots$$



إدارة ديروط

محافظة أسيوط

١٤

أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجة واحدة)

أولاً

١) مجموعة حل المعادلة : $|س| + س = ٠$ هي

(أ) $\{٠\}$ (ب) $[٠ ، \infty)$ (ج) $[-\infty ، ٠]$ (د) $\emptyset$

٢) في Δ د ه و إذا كان : $\widehat{\text{د}} = ١٢$ سم ، $\widehat{\text{ه}} = ١٥$ سم ، $\widehat{\text{و}} = ٧٢^\circ$

فإن : $\widehat{\text{و}} = \dots\dots\dots$ لأقرب سم .

١٨ (د)

١٠ (ج)

١٤ (ب)

١٦ (أ)

٣) مجموعة حل المتباينة : $|س - ٢| + |٢ - س| < ٦$ هي

(أ) $[٥ ، ١ -]$ (ب) $[١ - ، ٥]$ (ج) $[٥ ، ١ -]$ (د) $[١ - ، ٥]$

④ مجال الدالة د (س) = $\frac{1}{\sqrt{s}}$ هو

(أ) $[\infty, 0]$ (ب) $[\infty, 0]$ (ج) $\{0\}$ (د) $-\infty$

⑤ Δ س ص ع فيه : $\frac{س}{ص} = 6$ فإن طول قطر الدائرة المارة برؤوسه

يساوى وحدة طول.

(أ) ٩ (ب) ١٢ (ج) ٣ (د) ٦

⑥ إذا كانت : $س = \frac{2}{3}$ فإن : $١ - س =$

(أ) $1 \pm$ (ب) ١ (ج) $١ -$ (د) $\emptyset$

⑦ نهـا $\frac{\sqrt{٣ - ٤ + س}}{٥ - س} =$

(أ) صفر (ب) ٤ (ج) $\frac{1}{6}$ (د) $\frac{3}{5}$

⑧ الدالة الأحادية من بين الدوال الآتية هي

(أ) د (س) = $س^2 + ٢$ (ب) د (س) = $|س| + ١$

(ج) د (س) = $س$ مـا س (د) د (س) = $س^2 + ٤$

⑨ فى Δ أ ب ح إذا كان : $\hat{أ} = ٧$ سم ، $\hat{ب} = ٨$ سم ، $\hat{ح} = ٣$ سم

فإن : $\hat{د} = (٩ د) =$

(أ) ٣٠° (ب) ٦٠° (ج) ١٢٠° (د) ١٥٠°

⑩ لو س ص + لو س ص =
 (أ) س ص (ب) $\frac{1}{س ص}$ (ج) ١ (د) س + ص

⑪ نهـا $\frac{س^2 + ٣}{١ - س^2} =$

(أ) صفر (ب) ٢ (ج) ∞ (د) $٣ -$

ثانياً أسئلة الاختبار من متعدد (كل سؤال بدرجتين)

⑫ إذا كانت : د (س) = $٤ - س$ فإن قيمة س التى تحقق المعادلة :

د (س + ١) + د (س - ١) = ٦٨ هى

(أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٧

١٣) إذا كانت : نهـا $\frac{س٩ - س٩}{س٦ - س٦} = ١٢$ فإن : ٤ =
 (أ) ١ (ب) ٣ (ج) ٢ (د) ٤

١٤) نهـا $\frac{س٢٢ + س٢٢ + س٢٢}{س٢٢ + س٢٢ + س٢٢} = \dots\dots\dots$
 (أ) ١ (ب) $\frac{٣}{٥}$ (ج) $\frac{٢}{٣}$ (د) $\frac{١}{٢}$

١٥) إذا كان منحنى الدالة د (س) = لوم س يمر بالنقطة (٨ ، ٣) فإن د (١٦) =
 (أ) ٨ (ب) ٦- (ج) ٦ (د) ٤

١٦) إذا كانت : د (س) = س + ٢ ، س (س) = $\frac{س - س}{١ - س٣}$
 وكان (د س) = (١) (س س) = (٠) فإن : ل =
 (أ) ٣ (ب) ٧ (ج) ١ (د) ٢

١٧) نهـا $\frac{س٣ - س٣ + س٣ + س٣}{س٥ + س٦ - س٢} = \dots\dots\dots$
 (أ) ٢- (ب) ٢ (ج) ٥ (د) ٣

١٨) Δ ا ب ح فيه : ح (د) = ٣٣ ، ح (ب) = ١١٢ ، ح = ١٩ سم
 فإن : أ = سم.
 (أ) ١٧ (ب) ١٨ (ج) ١٩ (د) ٢٠

ثالثاً الأسئلة المقالية

١٩) ارسم منحنى الدالة د (س) = $\left. \begin{array}{l} س٢ \\ س - س \end{array} \right\}$ ، $٣ > س \geq ٠$ ، $٠ > س \geq ٢-$

ومن الرسم أوجد المدى واطراد الدالة.

٢٠) أوجد قيمة كل من م ، ل إذا كانت : نهـا د (س) = ٧
 حيث د (س) = $\left. \begin{array}{l} س٣ + س٢ م \\ س٥ + س ل \end{array} \right\}$ ، $٢ > س$ ، $٢ < س$



أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال درجة واحدة)

أولاً

١) نهـا $\frac{س^٢ + ٣س - ٤}{س^٢ - ١} = \dots\dots\dots$

- (أ) ٥ (ب) ٢ (ج) $\frac{٢}{٥}$ (د) $\frac{٥}{٢}$

٢) نهـا $\frac{س^٢ - ٦س + ٧}{س^٢(١ + س)} = \dots\dots\dots$

- (أ) $\frac{١}{٢}$ (ب) $\frac{١}{٨}$ (ج) $\frac{٧}{٢}$ (د) $\frac{١}{٣}$

٣) Δ س ص ع فيه : ع = ١٥ سم ، $\angle$ د س = ٧٠° ، $\angle$ د ص = ٥٠°
فإن : ص = سم تقريباً.

- (أ) ١٣ (ب) ١٤ (ج) ١٥ (د) ١٦

٤) في المثلث أ ب ح إذا كان : $\frac{أ}{٣} = \frac{ب}{٥} = \frac{ح}{٢}$ فإن أ : ب : ح =
٢ : ٢ : ٣ (د) ٢ : ٥ : ٦ (ج) ٢ : ٥ : ٣ (ب) ٤ : ٥ : ٦ (أ)

- (أ) ٤ : ٥ : ٦ (ب) ٢ : ٥ : ٣ (ج) ٢ : ٥ : ٦ (د) ٢ : ٢ : ٣

٥) المثلث أ ب ح فيه : أ = ٥ سم ، ب = ٨ سم ، $\angle$ د ح = $\frac{\pi}{٣}$

فإن : ح = سم

- (أ) ١٠ (ب) ١١ (ج) ١٢ (د) ١٣

٦) إذا كانت : د س = $٣س - ١$ فإن د^{-١} (٢) =
٣ (د) ٢ (ج) ١ (ب) ٠ (أ)

- (أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

٧) الدالة د : د س = س ط س دالة
(أ) فردية. (ب) زوجية.

(ج) ليست زوجية وليست فردية. (د) أحادية.

٨) مجموعة الحل للمعادلة : لو (س - ٢) = صفر في ح هي
(أ) {٣} (ب) {٨} (ج) {١٢} (د) {صفر}

- (أ) {٣} (ب) {٨} (ج) {١٢} (د) {صفر}

٩ إذا كانت د : $8 = (3)$ ، $11 = (8)$ فإن : $(س) (د) = (3)$ =

(أ) ٣ (ب) ٨ (ج) ١١ (د) ١٩

١٠ منحنى الدالة م : $(س) = -2 - (س + 1)^2$ هو نفس منحنى الدالة د : $(س) = س^2$

بإزاحة مقدارها وحدتان في اتجاه

(أ) $\overleftarrow{وس}$ (ب) $\overleftarrow{وس}$ (ج) $\overleftarrow{وص}$ (د) $\overleftarrow{وص}$

١١ إذا كان : $٣ - س = ٥$ ، $٨ - س = ٥$ فإن : $س =$

(أ) ٥ (ب) ٣ (ج) ٨ (د) صفر

ثانياً أسئلة الاختيار من متعدد (كل سؤال بدرجتين)

١٢ مجال الدالة د : $(س) = \sqrt{\frac{٢-س}{٣-س}}$ هو

(أ) $\{٣\} - \mathcal{C}$ (ب) $[٢, \infty) - \mathcal{C}$ (ج) $\{٣\} - [٢, \infty)$ (د) $[٢, \infty)$

١٣ مجموعة الحل في ح للمتباينة : $\sqrt{٢-س} - ٢ + س \leq ٤$ هي

(أ) $[٣, ٥]$ - ح (ب) $[٣, ٥) - \mathcal{C}$

(ج) $[٥, ٧) - \mathcal{C}$ (د) $[٢, ٦) - \mathcal{C}$

١٤ إذا كان : $لو٣ س + لو٣ ١٠ = لو٣ ٢٠$ فإن : $س =$

(أ) ٢ (ب) ١٠ (ج) ٣٠ (د) ٤٠

١٥ نهـ $\frac{١ - (٥ - س)^٧}{٦ - س} =$

(أ) ٦×٧ (ب) ٧×٦ (ج) ٧ (د) ٦

١٦ نهـ $\frac{١ - ح٣ + ح٣}{س - ح٣ - ح٣} =$

(أ) ١ (ب) -١ (ج) ٢ (د) صفر

١٧ قياس أصغر زوايا المثلث أ ب ح الذى أطوال أضلاعه ٣ سم ، ٥ سم ، ٧ سم

يساوى لأقرب درجة.

(أ) ٢٠° (ب) ٢٢° (ج) ٢١° (د) ١٢٠°

$$18) \left. \begin{array}{l} \text{إذا كانت : د (س) = } \frac{\sqrt{2-1-س}}{5-س} \\ \text{س} > 5 \text{ ، لها نهاية عند س} \leftarrow 5 \\ \text{س} < 5 \text{ ،} \end{array} \right\} \text{لـ} = \dots\dots\dots$$

فإن : لـ =

(د) $\frac{1}{4}$

(ج) $\frac{1}{4} -$

(ب) $4 -$

(أ) 4

ثالثاً الأسئلة المقالية

19) ارسم منحنى الدالة د : د (س) = (س - 1)² مبيناً المدى والاطراد ونوع الدالة من حيث كونها زوجية أم فردية أم غير ذلك.

$$20) \left. \begin{array}{l} \text{ابحث اتصال الدالة د : د (س) = } \frac{س^4 + 4س^3 + 2س^2 + 1}{س^2} \\ \text{س} > 0 \text{ ، عند س} = 0 \\ \text{س} \leq 0 \text{ ،} \end{array} \right\} \text{لـ} = \dots\dots\dots$$

٩٠. د (ج) متصلة على $\mathbb{R}$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

محافظة الاستمرارية

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (أ) ١ | (ب) ٢ | (ج) ٣ | (د) ٤ |
| (أ) ٥ | (ب) ٦ | (ج) ٧ | (د) ٨ |
| (أ) ٩ | (ب) ١٠ | (ج) ١١ | (د) ١٢ |
| (أ) ١٣ | (ب) ١٤ | (ج) ١٥ | (د) ١٦ |
| (أ) ١٧ | (ب) ١٨ | (ج) ١٩ | (د) ٢٠ |

٩١. د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$


د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$



٩٢. الدالة متقطعة في $[1, \infty)$

محافظة الانقطاعية

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (أ) ١ | (ب) ٢ | (ج) ٣ | (د) ٤ |
| (أ) ٥ | (ب) ٦ | (ج) ٧ | (د) ٨ |
| (أ) ٩ | (ب) ١٠ | (ج) ١١ | (د) ١٢ |
| (أ) ١٣ | (ب) ١٤ | (ج) ١٥ | (د) ١٦ |
| (أ) ١٧ | (ب) ١٨ | (ج) ١٩ | (د) ٢٠ |

٩٣. د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$


د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$



٩٤. الدالة متقطعة في $[1, \infty)$

محافظة التفرعية

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (أ) ١ | (ب) ٢ | (ج) ٣ | (د) ٤ |
| (أ) ٥ | (ب) ٦ | (ج) ٧ | (د) ٨ |
| (أ) ٩ | (ب) ١٠ | (ج) ١١ | (د) ١٢ |
| (أ) ١٣ | (ب) ١٤ | (ج) ١٥ | (د) ١٦ |
| (أ) ١٧ | (ب) ١٨ | (ج) ١٩ | (د) ٢٠ |

٩٥. الدالة متقطعة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$


د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$



٩٦. الدالة متقطعة في $[1, \infty)$

محافظة المروية

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (أ) ١ | (ب) ٢ | (ج) ٣ | (د) ٤ |
| (أ) ٥ | (ب) ٦ | (ج) ٧ | (د) ٨ |
| (أ) ٩ | (ب) ١٠ | (ج) ١١ | (د) ١٢ |
| (أ) ١٣ | (ب) ١٤ | (ج) ١٥ | (د) ١٦ |
| (أ) ١٧ | (ب) ١٨ | (ج) ١٩ | (د) ٢٠ |

٩٧. الدالة متقطعة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$


د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$


د (ج) متصلة عند $x=1$

د (ج) متصلة عند $x=1$



- * الدالة ليست زوجية وليست فردية.
* الدالة تنازعية في الفترة $]-\infty, 0]$
وتنازعية في $]0, +\infty[$

د (١٠) $y = \frac{1}{x}$ صغر
صغر $= \frac{1}{x} \times x = 1$
باجراء القسمة التركيبي البسيط والبالغ




∴ خارج القسمة $y = x + \frac{1}{x}$

نهيا $y = x + \frac{1}{x}$
من $y = x + \frac{1}{x}$

نهيا $y = x + \frac{1}{x} = (x - \frac{1}{x}) + \frac{2}{x}$
من $y = x - \frac{1}{x} + \frac{2}{x}$

ملاحظة الدوال

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (ب) ٤ | (أ) ٣ | (أ) ٢ | (ب) ١ |
| (د) ٨ | (أ) ٧ | (د) ٦ | (د) ٥ |
| (١) ١٢ | (أ) ١١ | (أ) ١٠ | (ب) ٩ |
| (ب) ١٦ | (د) ١٥ | (أ) ١٤ | (أ) ١٣ |
| (ب) ١٨ | (ب) ١٧ | (ب) ١٦ | (ب) ١٥ |



- * مدى الدالة $]-\infty, +\infty[$
* الدالة تنازعية في $]-\infty, 0]$
وتنازعية في $]0, +\infty[$

د (١٠) $y = \frac{1}{x}$ نهيا $y = \frac{1}{x}$
من $y = \frac{1}{x}$

نهيا $y = \frac{1}{x}$
من $y = \frac{1}{x}$

$y = \frac{1}{x}$

د (١٠) $y = \frac{1}{x}$ نهيا $y = \frac{1}{x}$
من $y = \frac{1}{x}$

عند $y = 0$


د (١٠) $y = \frac{1}{x}$ نهيا $y = \frac{1}{x}$
من $y = \frac{1}{x}$

∴ الدالة متصلة عند $y = 0$

ملاحظة الدوال

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (١) ٤ | (د) ٣ | (ب) ٢ | (ب) ١ |
| (١) ٨ | (د) ٧ | (أ) ٦ | (د) ٥ |
| (د) ١٢ | (١) ١١ | (أ) ١٠ | (ب) ٩ |
| (د) ١٦ | (د) ١٥ | (د) ١٤ | (ب) ١٣ |
| (ب) ١٨ | (ب) ١٧ | (ب) ١٦ | (ب) ١٥ |

- ١١ ملاحظة الدوال
- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (١) ٤ | (ب) ٣ | (د) ٢ | (ب) ١ |
| (د) ٨ | (١) ٧ | (أ) ٦ | (ب) ٥ |
| (ب) ١٢ | (ب) ١١ | (أ) ١٠ | (أ) ٩ |
| (ب) ١٦ | (ب) ١٥ | (ب) ١٤ | (أ) ١٣ |
| (ب) ١٨ | (د) ١٧ | (د) ١٦ | (د) ١٥ |



* مدى الدالة $\{y\} = \mathbb{R}$
* الدالة ليست زوجية وليست فردية.

د (١٠) $y = \frac{1}{x}$ نهيا $y = \frac{1}{x}$
من $y = \frac{1}{x}$

نهيا $y = \frac{1}{x}$
من $y = \frac{1}{x}$

$A = \frac{1}{x} \times x = 1$

ملاحظة الدوال


- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (د) ٤ | (١) ٣ | (د) ٢ | (ب) ١ |
| (١) ٨ | (أ) ٧ | (ب) ٦ | (١) ٥ |
| (د) ١٢ | (أ) ١١ | (د) ١٠ | (د) ٩ |
| (ب) ١٦ | (١) ١٥ | (أ) ١٤ | (أ) ١٣ |
| (ب) ١٨ | (ب) ١٧ | (ب) ١٦ | (ب) ١٥ |

د (١٠) $y = x + \frac{1}{x}$ نهيا $y = x + \frac{1}{x}$
من $y = x + \frac{1}{x}$
(بالقسمة على x ببساطة ومقاماً)
نهيا $y = x + \frac{1}{x}$
من $y = x + \frac{1}{x}$

∴ د (١٠) $y = x + \frac{1}{x}$ الدالة ليست متصلة

ملاحظة الدوال

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| (د) ٤ | (أ) ٣ | (أ) ٢ | (د) ١ |
| (أ) ٨ | (أ) ٧ | (ب) ٦ | (١) ٥ |
| (أ) ١٢ | (ب) ١١ | (١) ١٠ | (ب) ٩ |
| (ب) ١٦ | (ب) ١٥ | (ب) ١٤ | (ب) ١٣ |
| (ب) ١٨ | (ب) ١٧ | (ب) ١٦ | (ب) ١٥ |



* مجال الدالة $\mathbb{R}$


* الدالة تنازعية في $]-\infty, 0]$
وتنازعية في $]0, +\infty[$

د (١٠) $y = x + \frac{1}{x}$ نهيا $y = x + \frac{1}{x}$
من $y = x + \frac{1}{x}$

د (١٠) $y = x + \frac{1}{x}$ نهيا $y = x + \frac{1}{x}$
من $y = x + \frac{1}{x}$

د (١٠) $y = x + \frac{1}{x}$ نهيا $y = x + \frac{1}{x}$
من $y = x + \frac{1}{x}$

∴ الدالة متصلة عند $y = 0$



* المدي $\mathcal{E}$

* الدالة تزايدية في $\mathcal{E}$


* الدالة ليست زوجية وليست فردية.

٢٠) د $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ ما $f(2)$ ؟

د $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ ما $f(2)$ ؟

د $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ ما $f(2)$ ؟

∴ الدالة غير متصلة عند $x = 0$.



* المدي $[1, +\infty)$

* الدالة تناقصية في $[1, 2]$ ، و $[2, +\infty)$

وتزايدية في $[2, +\infty)$

٢١) ∴ $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ ما $f(2)$ ؟

∴ $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$ ما $f(2)$ ؟

$V = P^2 + Q^2 + R^2 = 0$





∴ $V = P^2 + Q^2 + R^2 = 0$

∴ $V = P^2 + Q^2 + R^2 = 0$

مناقشة سوالات

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| (1) ١ | (2) ٢ | (3) ٣ | (4) ٤ |
| (5) ٥ | (6) ٦ | (7) ٧ | (8) ٨ |
| (9) ٩ | (10) ١٠ | (11) ١١ | (12) ١٢ |
| (13) ١٣ | (14) ١٤ | (15) ١٥ | (16) ١٦ |
| (17) ١٧ | (18) ١٨ | (19) ١٩ | (20) ٢٠ |

كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9



حمل الآن

مجاناً وحصرياً

امتحانات رقم (2)

الترم الاول





إدارة عين شمس
توجيه الرياضيات

محافظة القاهرة

١



اختبار
تفاعلي ١

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) إذا كان مجال الدالة $d : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ هو $\{0\}$ فإن : $d = \dots$

- (أ) ٥ (ب) ٢٥ (ج) $0 \pm$ (د) ٥٠

٢) إذا كان $d : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ، $d(x) = x^2 + 5$ ، $d(2) = \dots$ فإن : $d(0) = \dots$

- (أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٧ (د) ٩

٣) إذا كان d دالة فردية ، $d(2) = 4$ ، $d(3) = \dots$ فإن : $d(-2) = \dots$

- (أ) ٢ (ب) ٢٢ (ج) $d(2)$ (د) صفر

٤) الدالة $d : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ تكون متماثلة حول النقطة $(2, 0)$ ، $d(2) = \dots$ تكون متماثلة حول النقطة $(2, 0)$ ، $d(2) = \dots$

- (أ) $(2, 0)$ (ب) $(0, 2)$ (ج) $(0, 0)$ (د) $(2, -2)$

٥) نقطة رأس المنحنى للدالة $d : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ، $d(x) = x^2 + 3x + 2$ هي $\dots$

- (أ) $(2, 3)$ (ب) $(2, -3)$ (ج) $(-2, 3)$ (د) $(-2, -3)$

٦) مجموعة الحل في $\mathbb{R}$ للمعادلة : $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{x-2}$ هي $\dots$

- (أ) $[0, 2) \cup \{2\}$ (ب) $[0, 2) \cup \{2\}$

- (ج) $[0, 2)$ (د) $[0, 2)$

٧) إذا كان : $\frac{1}{x} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-4}$ ، $x < 4$ ، فإن : $x = \dots$

- (أ) ١ (ب) ٣ (ج) ٢ (د) ٣

٨) إذا كانت : $\frac{1}{x} = \frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-4}$ ، فإن : $x + \frac{1}{x} = \dots$

- (أ) ١٦ (ب) صفر (ج) ١٦ ، ١٦- (د) صفر ، ١٦

٩) إذا كان : د (س) = $3س$ فإن قيمة س التي تحقق المعادلة :

د (س + ١) - د (س - ١) = ٢٤ تساوى

- (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٨ (د) صفر

١٠) إذا كانت الدالة د : د (س) = $\sqrt[3]{س}$ فإن : د (س) =

- (أ) $\frac{1}{3}$ س (ب) $س^3$ (ج) $س^2 - ١$ (د) $س^3 - ٣$

١١) إذا كان : لو (س + ١١) = ٢ فإن : س =

- (أ) ٩- (ب) ٢٢ (ج) ٨٩ (د) ٩١

١٢) مجال الدالة د : د (س) = لو١ - س هو

- (أ) $س < ٠$ (ب) $س > ١$ (ج) $٠ < س < ١$ (د) $٠ \leq س \leq ١$

١٣) المقدار $\frac{٣ لو٢ + ٤ لو٣}{٣}$ يكافئ المقدار

- (أ) لو٢ (ب) لو٣ (ج) لو٧ (د) لو١٢

١٤) نهـا $\frac{س - ٢}{س + ٢} = \frac{٦ - س - ٢}{١٢ - س + ٢}$

- (أ) $\frac{٥}{٧}$ (ب) $\frac{١}{٧}$ (ج) ١- (د) ٥-

١٥) نهـا $\frac{س - ٢}{س + ٢} = \frac{٣٢ - ٥}{٨ - ٣}$

- (أ) ٤ (ب) $\frac{٥}{٣}$ (ج) صفر (د) $\frac{٢٠}{٣}$

١٦) نهـا $\frac{س + ٥}{(٣ + ٢) س} = \frac{٥ + ٣}{(٣ + ٢) س}$

- (أ) $\frac{٥}{٨}$ (ب) ١ (ج) $\frac{١}{٢}$ (د) $\frac{٥}{٣}$

١٧) نهـا $\frac{س - ٢}{س + ٢} = \frac{٢ س}{٣ س}$

- (أ) $\frac{٤}{٩}$ (ب) $\frac{٤}{٣}$ (ج) $\frac{١}{٢}$ (د) $\frac{٥}{٣}$

١٨) إذا كان د : د (س) = $\left\{ \begin{array}{l} \frac{١ - (س)}{(١ - س)} \text{ ، } ١ > س \\ \frac{\pi س}{٤} \text{ ، } ١ < س < ٢ \end{array} \right.$ فإن : نهـا $\frac{س - ٢}{س + ٢} =$

- (أ) ١ (ب) $\frac{١}{٤}$ (ج) $\frac{\pi}{٤}$ (د) غير موجودة.



١٩) إذا كانت د : د (س) = $\left\{ \begin{array}{l} \frac{2-2+s}{1-s} \\ 2 \end{array} \right\}$ ، $s \neq 1$ ، متصلة عند $s = 1$ فإن $2 = \dots$


- (أ) ٣ (ب) ٤ (ج) $\frac{1}{4}$ (د) ١٢

٢٠) إذا كانت الدالة د لها نهاية عندما $s \rightarrow 3^-$ حيث :

د (س) = $\left\{ \begin{array}{l} \frac{s^2 - 2s + 2}{s + 3} , s > 3 \\ s + 1 , s < 3 \end{array} \right.$ فإن : $2 = \dots$

- (أ) ١- (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

٢١) في الشكل المقابل :



نهاية $s \rightarrow 2^-$ د (س) = $\dots$

- (أ) ٣-

- (ب) ٢

- (ج) ١-

- (د) غير موجودة.

٢٢) في Δ أ ب ح إذا كان ٣ ما أ = ٤ ما ب = ٢ ما ح فإن أ : ب : ح = $\dots$

- (أ) ٤ : ٣ : ٢ (ب) ٣ : ٤ : ٦ (ج) ٦ : ٣ : ٤ (د) ٣ : ٦ : ٤

٢٣) في Δ أ ب ح : ح (د) : ح (ب) : ح (أ) = ٤ : ٥ : ٣ = (د ح) :

فإن : ح : $\frac{1}{4} = \dots$

- (أ) ٢ : ٣ (ب) ٣ : ٢ (ج) $2 : \sqrt{6}$ (د) ٣ : ٤

٢٤) إذا كان : أ ب ح د شكل رباعي دائري فإن : ما أ + ما ح = $\dots$

- (أ) ١ (ب) صفر (ج) $\frac{1}{4}$ (د) ١-

٢٥) في Δ أ ب ح : أ = ٥ سم ، ب = ٧ سم ، ح (د ح) = 60°

فإن : ح : $\approx \dots$ لأقرب رقم عشري واحد.

- (أ) ٦,٢ (ب) ٥ (ج) ٤,٣ (د) ٣,٥

٢٦) Δ ٢٤ حرفيه : $٢٤ = ٢٢ - ٢٢ + ٢٢ + ٢٢ = ٢٢$ فإن : $٢ (د) = ٢٢$

(١) ٢٠ (ب) ٦٠ (ج) ١٢٠ (د) ١٥٠

٢٧) Δ ٢٤ حرفيه : $٢٤ = ٢٢ - ٢٢ + ٢٢ + ٢٢ = ٢٢$ فإن : مساحة Δ ٢٤ حرفيه : $٢٤ = ٢٢ - ٢٢ + ٢٢ + ٢٢ = ٢٢$

(١) ٧ (ب) ١٤ (ج) $\sqrt{٣٧}$ (د) $\sqrt{١٤}$

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الآتيين :

١) مثل بيانياً منحنى الدالة $د : (س) = \begin{cases} |س| \\ س^٢ \end{cases}$ ، $س \geq ٠$ صفر
، $س < ٠$ صفر

ومن الرسم أوجد مدى الدالة وابحث اطرافها.

٢) إذا كانت : $د (س) = \frac{س^٢ + ٢\sqrt{س}}{س}$ ابحث وجود نهاية للدالة $د$ عند $س = ٠$ صفر



إدارة العمومية
توجيه الرياضيات

محافظة الجيزة

٢



اختبار
تفاعلي ١

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) مجال الدالة $د (س) = \frac{س^٣}{٨ - س^٢}$ هو

(١) $س$ (ب) $س \in \{٨\}$ (ج) $س \in \{٢\}$ (د) $س \in [٨, \infty)$

٢) الدالة الأحادية من بين الدوال الآتية هي

(١) $س^٢$ (ب) $س - ١$ (ج) $|س|$ (د) $\frac{س}{س + ١}$

٣) إذا كانت : $د (س) = (س) = س$ وكان : $س = ٧$ فإن : $د (٧) = \dots\dots\dots$

(١) ١ (ب) ٥ (ج) ٧ (د) ٢٥

٤) نهاية $\frac{٢ - \sqrt{١ - س}}{٥ - س} = \dots\dots\dots$

(١) $\frac{١}{٤}$ (ب) $\frac{١}{٢}$ (ج) ٢ (د) ٤



- ⑤ إذا كان : نهـ $\frac{32 - 0}{5} = 8 - 4$ فإن : نهـ =
 (أ) ١٠ (ب) ١٠- (ج) ١٤ (د) ١٤-
- ⑥ نهـ $\frac{256 - 4}{4 + 5} = \dots\dots\dots$
 (أ) ٢٥٦ (ب) ١٢٨ (ج) ٢٥٦- (د) ٥١٢
- ⑦ مجموعة الحل للمعادلة : $|س - ١| = س - ١$ في ح هي
 (أ) ح (ب) ح - {١} (ج) [١ ، ∞) (د) [١ ، ∞ -
- ⑧ إذا كانت : $\frac{27}{8} = س + ٢$ فإن : س =
 (أ) $\frac{2}{3}$ (ب) ٣ (ج) ٥- (د) ٣-
- ⑨ إذا كان : لو ٣ = س ، لو ٤ = ص فإن : لو ١٢ =
 (أ) س ص (ب) س + ص (ج) س - ص (د) لو س + لو ص
- ⑩ مجموعة الحل للمعادلة : $\sqrt[3]{س} = ٨$ في ح هي
 (أ) ∅ (ب) {٢} (ج) {٤} (د) {٤ ±}
- ⑪ إذا كانت : د (س) = ٣ - س فإن قيمة س التي تحقق :
 د (س + ١) + د (س - ١) = ٣٠ هي
 (أ) ٢- (ب) ١ (ج) ٤ (د) ٢
- ⑫ ٩ ح مثلث فيه : ٦ سم ، ١٢ سم ، ٣٠ سم (د ب) = ٣٠
 فإن عدد المثلثات الممكنة =
 (أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣
- ⑬ في المثلث ٩ ح يكون : ح٢ + ٢ ح٢ ح٢ =
 (أ) ح٢ + ح٢ (ب) ح٢ + ح٢ (ج) ح٢ + ح٢ (د) ح٢ + ح٢ + ح٢
- ⑭ إذا كان : ٣ س + ١ = لو ٢٥ - لو ١٦ فإن : س =
 (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٢- (د) ١-
- ⑮ إذا كان : ٣ س = ٧ ص فإن : $\frac{ص}{س} = \dots\dots\dots$
 (أ) < (ب) > (ج) = (د) ≤
- ⑯ إذا كان : لو ٣ + ٩ لو ٣ - لو ٣ ح٢ = ٢ فإن : ٩ ح٢ =
 (أ) ٦ (ب) ٨ (ج) ٩ (د) ٥

١٧ نهـ $\frac{2}{1-s} = \dots\dots\dots$

- (أ) ١- (ب) ١ (ج) ٣ (د) ٣-

١٨ نهـ $\frac{s^2 + s}{1+s} = \dots\dots\dots$

- (أ) ٣ (ب) ١ (ج) صفر (د) ١-

١٩ نهـ $\frac{s^2 - 2s}{2-s} = ٤$ فإن : له = $\dots\dots\dots$

- (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

٢٠ مجموعة الحل للمتباينة : $|s-2| < ٢$ صفر في ح هي $\dots\dots\dots$

- (أ) ح - [٢، ٢-] (ب) [٢، ٢-] (ج) ح - [٢، ٢-] (د) [٢، ٢-]

٢١ نقطة تماثل الدالة د (س) = $\frac{5}{1-s} - ٢$ هي $\dots\dots\dots$

- (أ) (٢، ١) (ب) (٢، ١-) (ج) (١، ٢) (د) (١، ٢-)

٢٢ إذا كان : نهـ $\frac{(3-2)s^2 + 4s + 7}{s + ٥} = ٢$ فإن : $٢ \times ٢ = \dots\dots\dots$

- (أ) ٣ (ب) ٨ (ج) ٦ (د) ١٢

٢٣ نهـ $\frac{٣س - ٥ ط ٢س}{٤س + ٣س} = \dots\dots\dots$

- (أ) ٢- (ب) ١- (ج) ١ (د) ٢

٢٤ في المثلث أ ب ح يكون $\frac{٢}{\text{ح}} = \dots\dots\dots$ نق

- (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) $\frac{1}{3}$

٢٥ إذا كان : ٤ ح أ = ٣ ح ب = ٢ ح ج فإن : أ : ب : ج = $\dots\dots\dots$

- (أ) ٤ : ٣ : ٢ (ب) ٤ : ٢ : ٣ (ج) ٦ : ٤ : ٣ (د) ٣ : ٤ : ٦

٢٦ أ ح مثلث محيطه = ٧٠ سم ، ب = ٣٠ سم ، ج = ١٤ سم
فإن : ق = (د) = $\dots\dots\dots^\circ$

- (أ) ٣٠ (ب) ٦٠ (ج) ١٢٠ (د) ١٥٠

٢٧ في المثلث س ص ع يكون $\frac{s^2 + ص^2 - ع^2}{٢س ص} \geq \dots\dots\dots$

- (أ) [١، ١-] (ب) [١، ١-] (ج) [١، ١-] (د) [١، ٠]



الأسئلة المقالية

ثانياً

أجب عن السؤالين الآتيين :

١) ارسم منحنى الدالة $د (س) = (س - ٢)^٢ + ١$ ثم أوجد المدى وأبحث الاطراف

٢) إذا كانت $د (س) = ١٦$ عندما $س = ٢$ متصلة عند $س = ٢$ عندما $س < ٢$ عندما $س > ٢$ أوجد : قيمة $٤ ح + هـ$



إدارة العامرية
توجيه الرياضيات

محافظة الإسكندرية

٣



اختبار
تفاعلي ٢

أسئلة الاختيار من متعدد

أولاً

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) نها $س \rightarrow \infty$ $د (س) = \frac{(س - ٢)^٢ + ٦س + ١٢}{س - ٢ - ٤}$ فإن $٩ + ب =$

(أ) ١- (ب) ١ (ج) ٥ (د) ٥-

٢) عدد الطول الممكنة للمثلث $٩ ب ح$ الذي فيه :

٣٠° ، $ب = ٩$ سم ، $أ = ٦$ سم هو

(أ) واحد. (ب) اثنان. (ج) لا يوجد. (د) عدد لانهائي.

٣) إذا كانت الدالة $د : د (س) = ٤س$ فإن قيمة $س$ التي تحقق أن :

$د (س + ١) + د (س - ١) = ٦٨$ هي

(أ) ١٦ (ب) ٢ (ج) ٨ (د) ٤

٤) مجال الدالة $د (س) = \sqrt{٦ - س}$ هو

(أ) $[٦، \infty)$ (ب) $[٦، \infty]$ (ج) $[-٦، \infty)$ (د) $[-٦، \infty]$

٥) إذا كان $د$ دالة فردية فإن $د (س) = \frac{٢س + ٨د (س - ١)}{٣د (س)}$ =

(أ) صفر (ب) ٢- (ج) ٤- (د) ٤

$$\textcircled{6} \quad \frac{5 - 2\sqrt{5}}{4 - 1 + \sqrt{5}} = \dots\dots\dots$$

- (أ) 5 (ب) 8 (ج) 6 (د) 48

٧ إذا كان Δ ح فيه 6 أ = 4 ب = 3 ج فإن قياس أصغر زوايا المثلث لأقرب دقيقة =

- (أ) ٥٧°٢٨ (ب) ٤١°١٢ (ج) ٢٨°٥٧ (د) ٣٦°٥٢

٨ منحنى الدالة د (س) = س + ٤ هو نفس منحنى الدالة م (س) = س + ٢ بإزاحة مقدارها ٤ وحدات فى اتجاه

- (أ) و ← (ب) و ← (ج) و ← (د) و ←

٩ مدى الدالة د (س) = $\frac{2}{3} - 1$ هو

- (أ) $\{3\} - \mathcal{C}$ (ب) $\{1\} - \mathcal{C}$ (ج) $\{1\} - \mathcal{C}$ (د) $\{3\} - \mathcal{C}$

١٠ مجموعة حل المتباينة: $\sqrt{2 - 6 + 9} \geq 2$ فى ح هو

- (أ) $[6, 0]$ (ب) $[6, 0]$ (ج) $[-6, 0]$ (د) $[-6, 0]$

١١ إذا كانت: د (س) = لو_٢ (س + ٤) وكان: د^{-١} (٣) = ١ فإن: ل =

- (أ) 4 (ب) 5 (ج) 6 (د) 7

١٢ إذا كانت: د (س) = $\sqrt{2 - 6 + 9}$ ، م (س) = س - ٢

فإن: (د م) = (٣ -) =

- (أ) 2 (ب) 4 - (ج) $2\sqrt{2}$ (د) غير معرفة

١٣ الدالة الأحادية من الدوال الآتية هى

- (أ) س + 2 (ب) $3 - \sqrt{2}$ (ج) $|3 + \sqrt{2}|$ (د) 4

١٤ فى أى مثلث أ ب ح يكون $\frac{4}{\sqrt{2}} \times \frac{4}{\sqrt{2}} = \dots\dots\dots$

- (أ) $\frac{4}{\sqrt{2}}$ (ب) $\frac{4}{\sqrt{2}}$ (ج) 4 نق (د) 1

$$\textcircled{15} \quad \frac{5 - 2\sqrt{5}}{1 + \sqrt{5}} = \dots\dots\dots$$

- (أ) $\frac{5}{3}$ (ب) $\frac{5}{3}$ (ج) $\frac{10}{3}$ (د) $\frac{2}{3}$



١٦ نهـا $\frac{ما س}{\frac{س}{٢}} = \dots\dots\dots$

(١) $\frac{٢}{١٠}$ (ب) $\frac{١٠}{٣}$ (ج) $\frac{١٥}{٢}$ (د) $\frac{٥}{٦}$

١٧ لو $\left(\frac{٢٢}{ب ح}\right) = \dots\dots\dots$ حيث ٢، ب، ح $\exists$ ح⁺

(١) ٢ لو ٢ + لو ب + لو ح (ب) ٢ لو ٢ - لو ب + لو ح
(ج) ٢ لو ٢ - لو ب - لو ح (د) ٢ (لو ٢ - لو ب - لو ح)

١٨ Δ ٢ ب ح فيه : $\frac{ب - أ}{ب + ح} = \frac{ح}{ب + أ}$ فإن : ح (د) = $\dots\dots\dots$

(١) ٦٠ (ب) ٣٠ (ج) ٤٥ (د) ١٢٠

١٩ إذا كان طول قطر الدائرة الخارجة للمثلث ٢ ب ح = ٣ سم

فإن : $\frac{أ ب ح}{ما ب ما ح} = \dots\dots\dots$

(١) ٢١٦ (ب) ٨ (ج) $\frac{٢٧}{٨}$ (د) ٢٧

٢٠ في المثلث ٢ ب ح إذا كان : ٢ = ٤ سم ، ٢ = ٥ سم ، ٢ = ٤ سم ،

فإن : ح = $\dots\dots\dots$ سم

(١) ٤ (ب) ٥ (ج) ٦ (د) ٧

٢١ نهـا $\frac{س + ٣ س - ٥}{١ - ٢ س} = \frac{٥}{٢}$ فإن : ل = $\dots\dots\dots$

(١) ٢- (ب) ٤ (ج) ١- (د) ٣-

٢٢ إذا كانت : د (س) = $\left\{ \begin{array}{l} \frac{س + ٢ س}{س} ، س < صفر \\ ٢ + ما س ، س \geq صفر \end{array} \right.$

فإن : نهـا د (س) = $\dots\dots\dots$

(١) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) $\frac{٢}{٣}$

٢٣ نهـا $\frac{٢ ما س + ما ٥ س}{ما ٣ س} = \dots\dots\dots$

(١) ١٠ (ب) ٥ (ج) ٢ (د) $\frac{٤}{٣}$

٢٤ نهـا $\frac{س ما س}{\pi} = \dots\dots\dots$

(١) صفر (ب) $\pi -$ (ج) π (د) غير موجودة

- ٢٥) لو س + لو ص - لو ع = ٢ فإن : س ص ع =
 (أ) ٢ (ب) ١٠ (ج) ٢٠ (د) ١٠٠
- ٢٦) إذا كان : $٣ \times ٧ \times ٥ = ٢٢٥$ فإن : س =
 (أ) ٤٩ (ب) ٢٥ (ج) ٣٦ (د) ١٥
- ٢٧) إذا كان : $٣ = ٥$ فإن : $٣ + ٢ =$
 (أ) ٥ (ب) ٧ (ج) ٤٥ (د) ٩٠

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الآتيين :

- ١) إذا كانت الدالة د متصلة في ح حيث د (س) = $\left\{ \begin{array}{l} \frac{١٢٨ - ٧}{٨ - ٣} \text{ س} \\ ٢ \neq \text{س} \\ ٢ = \text{س} \end{array} \right\}$ لـ أوجد قيمة : لـ

- ٢) ارسم منحنى الدالة د (س) = (٢ - س) + ٣ ومن الرسم استنتج مدى الدالة ونوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك.



إدارة بنها

محافظة القليوبية

٤



اختبار
تفاعلي ٤

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١) جميع الدوال الآتية أحادية على مجالها ما عدا الدالة د (س) =
 (أ) ٣ (ب) ٥ (ج) $\frac{١}{س}$ (د) ٧
- ٢) مجال الدالة د (س) = $\frac{٣ - س}{٥ - س}$ هو
 (أ) $[-٣, \infty)$ (ب) $[-٣, \infty)$ (ج) $\{٥\} - [-٣, \infty)$ (د) $\{٥\} - [-٣, \infty)$
- ٣) مدى الدالة د (س) = $٣ - ٢$ هو
 (أ) $[-٣, \infty)$ (ب) $[-٣, \infty)$ (ج) $[-٣, \infty)$ (د) $[-٣, \infty)$
- ٤) إذا كانت : د (س) = $١ + س$ ، س (س) = ٢ فإن : د (س) = (٥)
 (أ) ٦ (ب) ٢٦ (ج) ٥ (د) ٣٠



٥ إذا كانت د : دالة فردية مجالها ح وكان : د (٣) = ٥

فإن : د (٣) + د (٣-) =

(أ) -١٠ (ب) صفر (ج) ١٠ (د) ١٥

٦ منحنى الدالة د (س) = ٣ - س^٢ هو نفس منحنى الدالة س (س) = س^٢ بإزاحة

مقدارها ثلاث وحدات في اتجاه

(أ) و ← (ب) و ← (ج) و ← (د) و ←

٧ إذا كانت الدالة د : د (س) = (س) (س) دالة أسية تزايدية فإن :

(أ) ٠ < ٢ < ٣ (ب) ٣ ≤ ٢ (ج) ٢ > ٣ > ٥ (د) ٣ < ٢

٨ إذا كان : ٣ = س - ٢ فإن : ١ + س =

(أ) ٥ (ب) ١٢ (ج) ١٦ (د) ٢٧

٩ إذا كانت : θ زاوية حادة فإن : قيمة المقدار لو (منا θ) + لو (قا θ) =

(أ) ١- (ب) صفر (ج) ١ (د) ٢

١٠ إذا تقاطع منحنى الدالتين د (س) ، د^{-١} (س) في النقطة (ل ، ٢ - ل) فإن : ل =

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

١١ إذا كان : د (س) = س - ٢ فإن : د (س) + (١ + س) د (س) =

(أ) ٢ (ب) ٦ (ج) ٨ (د) ٤

١٢ مجال الدالة د حيث د (س) = لو (س - ٥) هو

(أ) [٥ ، ∞) (ب) [٥ ، ١) (ج) [٥ ، ∞) (د) [١ ، ∞)

(أ) [٥ ، ∞) (ب) [٥ ، ١) (ج) [٥ ، ∞) (د) [١ ، ∞)


١٣ الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة

د (س) = لو (س + ٦)

فإن : د (٧) + د^{-١} (٢) =

(أ) ٩ (ب) ٨

(ج) ٧ (د) ٦



١٤) نهـا $\frac{3-s}{9-2s}$ =

- (أ) ٣ (ب) ٦ (ج) $\frac{1}{3}$ (د) $\frac{1}{6}$

١٥) إذا كانت : نهـا $\frac{5+2s}{7-2s} = 3$ فإن : =

- (أ) ٦ (ب) ٥ (ج) ٧ (د) ٩

١٦) إذا كانت : د (س) = $\left\{ \begin{array}{l} \frac{2-s}{3-7+s} , \text{ س} \neq 2 \\ 5 , \text{ س} = 2 \end{array} \right\}$

فإن : نهـا د (س) =

- (أ) صفر (ب) ٥ (ج) ٦ (د) ليس لها وجود.

١٧) نهـا $\frac{3s+2s+5s}{4s+2s} = \frac{2s+5s}{4s+2s}$ =

- (أ) $\frac{1}{3}$ (ب) ٢ (ج) ٨ (د) $\frac{15}{8}$

١٨) نهـا $\frac{3s-2s}{2s} = \frac{3s-2s}{2s}$ =

- (أ) صفر (ب) ٢ (ج) ٣ (د) غير موجودة.

١٩) إذا كانت الدالة د : د (س) = $\left\{ \begin{array}{l} 3+s , \text{ س} > 2 \\ 1+s-2s , \text{ س} \leq 2 \end{array} \right\}$ متصلة عند س = ٢

فإن : =

- (أ) ١- (ب) ٢- (ج) ٣- (د) ٣

٢٠) نهـا $\frac{32-s}{10-s+3s+2s} = \frac{32-s}{10-s+3s+2s}$ =

- (أ) ٨٠ (ب) $\frac{80}{7}$ (ج) $\frac{7}{80}$ (د) $\frac{1}{80}$

٢١) نهـا $\frac{128-7(3-2)}{4} = \frac{128-7(3-2)}{4}$ =

- (أ) ٣٣٦ (ب) ٣٣٦- (ج) ٤٤٨ (د) ٤٤٨-



٢٢ إذا كان : $\frac{2}{3} = \frac{4}{5} = \frac{6}{7}$ فإن : $أ : ب : ج =$

(أ) ٣ : ٤ : ٥ (ب) ٦ : ٨ : ١٠ (ج) ٣ : ٨ : ٥ (د) ٦ : ٤ : ١٠

٢٣ في Δ س ص ع تكون العلاقة : $\frac{س^2 + ص^2 - ع^2}{س \cdot ص} \supseteq$

(أ) $[-1, 1]$ (ب) $[-1, 1]$ (ج) $[-2, 2]$ (د) $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$

٢٤ س ص ع مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه ١٠ سم فإن طول قطر الدائرة الخارجة لهذا المثلث يساوى سم

(أ) ١٠ (ب) ١٥ (ج) ٢٠ (د) ٣٠

٢٥ عدد الحلول الممكنة للمثلث س ص ع الذى فيه :

$ص = ٣٠$ ، $ص = ٩$ سم ، $س = ٦$ سم هو

(أ) واحد. (ب) حلان. (ج) لا يوجد حل. (د) عدد لانهاى.

٢٦ في Δ أ ب ح يكون $\frac{2}{3} = \frac{4}{5} = \frac{6}{7}$ نق.

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٦

٢٧ قياس أكبر زاوية فى المثلث الذى أطوال أضلاعه ٣ سم ، ٥ سم ، ٧ سم

تساوى

(أ) ٦٠° (ب) ٩٠° (ج) ١٢٠° (د) ١٥٠°

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الاتيين :

١ استخدم منحنى الدالة د حيث د (س) = $\frac{1}{س}$ لتمثيل الدالة س (س) = $\frac{2}{1+س}$

ومن ثم عين مجالها ومداها.

٢ إذا كانت الدالة د (س) = $\left\{ \begin{array}{l} م + س + ل \\ ل س - ٢ س + ٧ \end{array} \right.$ ، $س > ١$ ، لها نهاية عند $س = ١$

وقيمتها تساوى ه أوجد قيمة : ل ، م



اختبار
تفاعلي ٥

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) مجموعة حل المعادلة : لو $س + ٦$ لو $س = ٥$ هي

- (أ) $\{٢, ٣\}$ (ب) $\{٢٥, ١٢٥\}$ (ج) $\{١٢٥\}$ (د) $\{٢٥\}$

٢) نه $\frac{س + ٣س}{٥س} = \dots\dots\dots$

- (أ) ٣ (ب) $\frac{٩}{٥}$ (ج) $\frac{٤}{٥}$ (د) ٤

٣) $س$ ، $ص$ زاويتان متكاملتان فإن : ق $س + \frac{١}{ص}$ =

- (أ) ١ (ب) $١ -$ (ج) صفر (د) خلاف ذلك.

٤) مجال الدالة د (س) = $\sqrt{١ - س}$ هو

- (أ) $[-١, \infty)$ (ب) $[-١, \infty)$ (ج) $[-١, \infty)$ (د) $[-١, \infty)$

٥) إذا كانت : نه $\frac{س - ٦٤}{٨ - ٣س} = ١٦$ فإن : ل =

- (أ) ٣ (ب) ٦ (ج) ٤ (د) ٢

٦) إذا كان : د (س) = $س^٢$ ، س (س) = $س + ٣$

فإن : (د س) تكون دالة

- (أ) أحادية. (ب) فردية. (ج) زوجية. (د) خطية.

٧) $\Delta س ص ع$ فيه : ص $^٢ = (ع - س)^٢ + س^٢$ فإن : و (د ص) =

- (أ) ١٢٠° (ب) ٩٠° (ج) ٣٠° (د) ٦٠°

٨) إذا كانت : (٣ ، ٣) هي نقطة تماثل منحنى الدالة د (س) = $\frac{١}{س - ٣} - ح$

حيث $٢ \leq س \leq ١٠$ ، ب ، ح $\in [٢, ١٠]$ فإن : $٢ + ح = \dots\dots\dots$

- (أ) ١ (ب) $١ -$ (ج) $\frac{١}{٢}$ (د) $\frac{١}{٢}$

٩) نه $\frac{س - ٧ - ٢س - ٣س - ١}{١ + ٣س - ٥س} = \dots\dots\dots$

- (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ١ (د) ٦



- ١٠) إذا كان : $3 + 3 = 1000$ فإن : $3 - 1 = \dots$
- (أ) صفر (ب) $1 - \frac{1}{4}$ (ج) $6 -$ (د) ٦
- ١١) إذا كان : لو $3 = \frac{(لو^2 - 27 لو)}{0.003}$ فإن : $3 = \dots$
- (أ) $3 \pm$ (ب) $3 -$ (ج) ٣ (د) صفر
- ١٢) عدد حلول المثلث ل م ن الذي فيه : م ن = ٩ سم ، ل ن = ٦ سم ، م (د ل) = 70° هو
- (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) صفر
- ١٣) نقطة تماثل منحنى الدالة د (س) = $1 - (س + 2)^2$ هي
- (أ) (٢ ، -١) (ب) (١- ، ٢) (ج) (١ ، -٢) (د) (-٢ ، ١)
- ١٤) نه $\frac{1}{1 - س} = \frac{2 - 3 + س}{2 - س} = \dots$
- (أ) $\frac{1}{8}$ (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) $1 -$ (د) $\frac{1}{8}$
- ١٥) إذا كانت : د (س) = $س + ٥$ فإن : د $1 -$ (س) =
- (أ) $س + ٥$ (ب) $س - ٥$ (ج) $س + ٥ -$ (د) $\frac{س}{٥}$
- ١٦) مساحة المثلث المتساوي الأضلاع الذي طول ضلعه $4\sqrt{3}$ سم هي سم^٢
- (أ) $12\sqrt{3}$ (ب) $16\sqrt{3}$ (ج) $8\sqrt{3}$ (د) $4\sqrt{3}$
- ١٧) لو $12 - 4 = 3$ =
- (أ) لو 1000 (ب) لو ١٠ (ج) لو ١٠٠ (د) لو ١٠٠٠
- ١٨) نه $\frac{\pi}{2 - س} = \frac{\pi}{س} = \dots$
- (أ) ١ (ب) $1 -$ (ج) صفر (د) π
- ١٩) مجموعة حل المتباينة : $\sqrt{س^2 - 6س + 9} < ١$ في ح هي ح -
- (أ) [١ ، ٣] (ب) [٢ ، ٤] (ج) [٢ ، ٤] (د) [٢ ، ٤]
- ٢٠) نه $\frac{س^2 + ٤س - ٤٠}{2 - س} = \dots$
- (أ) ٦٠ (ب) ٨٠ (ج) ٩٢ (د) ١٦

٢١) في ΔABC إذا كان : $MA : MB : MC = 3 : 5 : 7$ فإن قياس أصغر زواياه لأقرب درجة هي

- (أ) ٢٢ (ب) ٢٣ (ج) ٢٤ (د) ٢٥

٢٢) إذا كانت : $D = (S)$ فإن قيمة S التي تحقق العلاقة :
 $D = (S + 1) + D = (S - 1) = 26$ هي

- (أ) ١- (ب) ٢ (ج) ٤ (د) ١

٢٣) نهـ $\frac{1}{S} = \frac{3S^2 + 2S - 5}{1 - S} = \dots\dots\dots$

- (أ) ١٣ (ب) ٥ (ج) ٩ (د) ١٣-

٢٤) إذا كانت : D دالة فردية فإن : $\frac{2D + (3) + 7 + (3-)}{(3-) + 10} = \dots\dots\dots$

- (أ) ٣ (ب) $\frac{1}{3}$ (ج) ٣- (د) $\frac{1}{3}-$

٢٥) إذا كان : $S = \frac{2}{3}$ فإن : $S = \dots\dots\dots$

- (أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ٨ (د) خلاف ذلك.

٢٦) ΔABC S ص ع محيطه = ٣٣ سم ، $3MA + 3MB + 3MC = 2$ ، $4MA = 1$ فإن : $S = ع = \dots\dots\dots$ سم

- (أ) ٩ (ب) ٨ (ج) ١٠ (د) ١٢

٢٧) إذا كانت : $D = (S) = \left\{ \begin{array}{l} S - 2, S \geq 1 \\ S, S < 1 \end{array} \right.$ فإن : نهـ $\frac{1}{S} = (S) = \dots\dots\dots$

- (أ) ١ (ب) $\frac{1}{3}-$ (ج) $\frac{1}{3}$ (د) ليس لها وجود.

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الآتيين :

١) ارسم الشكل البياني للدالة $D = (S) = \frac{8}{1 + |S|}$ ومن الرسم استنتج نوع الدالة ومداه.

٢) أوجد قيمة 9 التي تجعل الدالة : $D = (S) = \left\{ \begin{array}{l} S - 2, S \leq 9 \\ S, S > 9 \end{array} \right.$ متصلة عند $S = 9$




اختبار
تفاعلي ١

أسئلة الاختيار من متعدد

أولاً

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) أى من الأشكال البيانية الآتية لا تمثل دالة فى S :



٢) مجال الدالة $D = \{S \mid -4 \leq S \leq 4\}$ هو

(أ) $[-4, 4]$ (ب) $[-4, \infty)$ (ج) $[-4, 4]$ (د) $[-4, \infty)$

٣) إذا كانت $D = \{S \mid 3 - S = 1\}$ ، $S = (3 + S) = 1 - 2$ ،

فإن : $(D \cap S) = \{6\}$

(أ) ٦ (ب) ١٣ (ج) ٨ (د) ١١

٤) مجموعة حل المتباينة : $|2 - S - 6| + |3 - S| > 12$ هي

(أ) $[-1, 7]$ (ب) $[-3, 9]$ (ج) $[-1, 7]$ (د) $[-3, 9]$

٥) مجموعة الحل فى S للمعادلة : $|2 - S| = |7 - S|$ تساوى

(أ) $\{2, -5\}$ (ب) $\{3\}$ (ج) $\{5\}$ (د) $\emptyset$

٦) إذا كانت : $D = \{S \mid S^2 = 5\}$ فإنها تكون

(أ) زوجية. (ب) فردية.

(ج) زوجية وأحادية. (د) ليست زوجية وليست فردية.

٧) إذا كان : $S = 5$ فإن : $S + 1 = \dots$ حيث $S \in \dots$

(أ) ٢٠ (ب) ٦٢٥ (ج) ١٢٥ (د) ١٥

٨) إذا كان : $١٠٣ - ٥ = ٧ - ٤$ فإن : $١ - ٢ = \dots$

- (أ) ٥ (ب) ٤ (ج) ٣ (د) ٧

٩) إذا كانت : د (س) = $٢ - س$ فإن قيمة س التي تحقق المعادلة :
د (س + ١) - د (س - ١) = ٣٨٤ تساوى

- (أ) ١٦ (ب) ٤ (ج) ٨ (د) ٢

١٠) إذا كانت : د (س) = $\sqrt[٥]{س}$ فإن : د (٢) =

- (أ) ٤ (ب) ٨ (ج) ٣٢ (د) ١

١١) إذا كان : لو س = ٤ فإن : قيمة لو $\left(\frac{س}{٥}\right) = \dots$

- (أ) ٣ (ب) ١٢٥ (ج) ٢٥ (د) ٢

١٢) إذا كان : لو ص = ٣ - س فإن : ص =

- (أ) ٣ ص (ب) $\frac{١}{٣}$ ص (ج) $\frac{١}{٣}$ ص (د) ٣ ص

١٣) إذا كان : لو ٢ ص = ٨

فإن : ٣ لو ٢ ص + ٤ لو ٢ ص - لو ٢ ص =

- (أ) صفر (ب) ٤ (ج) ٨ (د) ١٦

١٤) نهـ $\frac{١ + س}{١ - س} = \dots$

- (أ) ٣ (ب) ١ (ج) ٢ (د) غير موجودة.

١٥) نهـ $\frac{٢٢ - س}{٢ - س} = \dots$

- (أ) $\frac{٨٠}{٧}$ (ب) $\frac{١٦}{٧}$ (ج) ٨٠ (د) ١٦

١٦) نهـ $\frac{٥ - س}{٣ - ٤ + س} = \dots$

- (أ) ٥ (ب) ٦ (ج) ٣٠ (د) غير موجودة.

١٧) إذا كان : نهـ $\frac{٣٢ - س}{٢ - س} = ل$ فإن : ل ، ل تساوى

- (أ) ٣٢ ، ٦ (ب) ١٩٢ ، ٦ (ج) ٨٠ ، ٥ (د) ١٦ ، ٥

١٨) نهـ $\frac{٧ + س + ٣ - س}{١ + س - ٣ - س} = \dots$

- (أ) ٥ (ب) $\frac{٣}{٧}$ (ج) ٧ (د) غير موجودة.



١٩) نهـ = $\frac{3س - 2س + 5س}{2س - 3س}$

(١) - $\frac{8}{5}$ (ب) - $\frac{5}{17}$ (ج) - $\frac{8}{17}$ (د) - ١

٢٠) إذا كانت : د (س) = $\begin{cases} 3س - 2 , & 2 \geq س \\ 4س + 5 , & 2 < س < 5 \\ 12س - 2 , & 5 \leq س \end{cases}$

متصلة عند س = ٢ ، س = ٥ فإن : ٩ + س =

(١) - ٢ (ب) - ١ (ج) - ٣ (د) - ٢

٢١) الدالة د : د (س) = $4س^2 + \frac{س}{9س - 2}$ متصلة لكل س $\exists$

(١) ح (ب) ح - {٠}

(ج) ح - {٣ ، -٣} (د) ح - {٢ ، -٢ ، ٣ ، ٠}

٢٢) طول أصغر ضلع في المثلث أ ب ح الذي فيه : د (١) = $43^\circ 54'$

، و (د) = $62^\circ 49'$ ، أ = $124,5$ سم يساوى لأقرب سم.

(١) ٥٥ (ب) ٨٤ (ج) ١٤٨ (د) ١١٦

٢٣) مثلث ل م ن فيه : ل = $8,4$ سم ، و (د م) = 75° ، و (د ن) = 50°

فإن مساحة الدائرة المارة برؤوس المثلث ل م ن هو لأقرب سم^٢

(١) ٨٣ (ب) ٧٠ (ج) ٥٣ (د) ٣٥

٢٤) إذا كان نق طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوس المثلث أ ب ح فإن : $\frac{س}{نق} \exists$


(١) [٠ ، ٢] (ب) [٢ ، ٠] (ج) [٢ ، ٢] (د) [٢ ، -٢]

٢٥) إذا كانت مساحة المثلث أ ب ح = 24 سم^٢ فإن : (س + ح - ٢) ط أ =

(١) ١٢ (ب) ٢٤ (ج) ٤٨ (د) ٩٦

٢٦) أ ب ح مثلث فيه : ما أ = $\frac{2}{3}$ ما ب = $\frac{1}{3}$ ما ح فإن ح : أ : ب =

(١) ٤ : ٣ : ٢ (ب) ٣ : ٢ : ٤ (ج) ١ : ٢ : ٣ (د) ١ : ٣ : ٢



٢٧) $\overline{AB}$ جزء شبه منحرف فيه : $\overline{AC} \parallel \overline{BC}$

$59 = 7.4$ سم ، $\angle 1 = 62^\circ$ ،

$\angle 2 = 106^\circ$ ، $\angle 3 = 41^\circ$ ،

فإن مساحة المثلث $\overline{ABC}$ لأقرب سم^٢ =

٧٥ (د)

٦٢ (ج)

٩٣ (ب)

٣٩ (أ)

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين التاليين :

١) ارسم منحنى الدالة $d : (س) = |س - ٤|$ محدداً مداها وفترات اطرادها ونوعها من حيث زوجية أو فردية.

٢) إذا كانت : نهـ $\left(\frac{١}{س} + ٣س + ٢س - ٥ \right) = ٣$ فما قيمة كل من : ٢ ، ٣



إدارة غرب طنطا (علمي)
توجيه الرياضيات

محافظة الغربية

٧



اختبار
تفاعلي

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) الدالة الأحادية من بين الدوال المعرفة بالقواعد الآتية هي

(ب) $س = (س)$

(أ) $د (س) = س + ٣$

(د) $٢س + ٣ = (س)$

(ج) $٢س = (س)$

٢) نهـ $\left(\frac{١}{س} + ٣س + ٢س - ٥ \right) = ٣$ ،

(د) ١٢

(ج) ٢٢

(ب) ٦

(أ) ٣

٣) ΔABC مساحة سطحه $٢١\sqrt{٣}$ سم^٢ ، $٦ = AC$ سم ، $\angle 1 = 60^\circ$ ،

فإن : $BC =$

(د) $\sqrt{١٤}$

(ج) $\sqrt{٧}$

(ب) ٧

(أ) ١٤

٤) مجموعة حل المتباينة : $|س - ٢| \geq ٤$ هي

(د) $[-٢, ٦]$

(ج) $[-٢, ٦]$

(ب) $[-٢, ٦]$



٥) نهـا $\frac{س^7 + ١٢٨}{س^٤ - ١٦} = \dots\dots\dots$

- (أ) ١٤ (ب) ٩ (ج) ٩- (د) ١٤-

٦) المساحة المحصورة بين منحنى الدالة $د(س) = |س - ٣| - ٤$ ومحور السينات $= \dots\dots\dots$ وحدة مساحة.

- (أ) ٨ (ب) ٧ (ج) ١٤ (د) ١٦

٧) مجال الدالة $د : د(س) = لو(٣-س)$ س هو $\dots\dots\dots$

- (أ) $[٣، ٠]$ (ب) $(٣، ٠]$ (ج) $[٣، ٠)$ (د) $(٣، ٠)$

٨) الشكل المقابل يبين منحنى الدالتين $د، م$


فإن : $(م \cap د) = (١) = \dots\dots\dots$

- (أ) ٦

- (ب) ٥

- (ج) ٢-

- (د) ٤



٩) نهـا $٣س$ قـا $٦س = \dots\dots\dots$

- (أ) ٦ (ب) $\frac{1}{٦}$ (ج) ١٨ (د) ٢

١٠) عدد حلول Δ $س$ ص ع الذى فيه : $س = ٥$ سم ، $ص = ٦$ سم ، $و(د-س) = ٧٠^\circ$ يساوى $\dots\dots\dots$

- (أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

١١) إذا تقاطع منحنى الدالة $د$ مع منحنى الدالة $د^{-١}$ فى النقطة $(٤، ٢)$ لـ $(٣ - لـ)$ فإن : $لـ = \dots\dots\dots$

- (أ) ١ (ب) ٣ (ج) ٣- (د) ١-

١٢) إذا كانت : $د(س) = \begin{cases} س + ٣ ، س < ١ \\ س - ٣ ، س > ١ \end{cases}$ ، نهـا $د(س)$ موجودة فإن : $١ = \dots\dots\dots$

- (أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٤

- ١٣) مجموعة حل المعادلة : $(2 - x)^4 = 81$ في ح هي
 (أ) $\{1, 2\}$ (ب) $\{-1, 2\}$ (ج) $\{1, 2\}$ (د) $\{-1, 2\}$
- ١٤) إذا كان : $4 > 3 > 2$ فإن : نه $\frac{1}{x} = \frac{1}{y}$
 (أ) $4 - 3$ (ب) صفر (ج) ∞ (د) $\infty -$
- ١٥) نقطة تماثل الدالة $D(x) = \frac{1+x^2}{1+x}$ هي
 (أ) $(1, 2)$ (ب) $(-1, 2)$ (ج) $(1, -2)$ (د) $(-1, -2)$
- ١٦) إذا كان طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوس $\Delta ABC = 3$ سم وكان :
 $MA + MB + MC = 2$ فإن محيط $\Delta ABC =$ سم
 (أ) 6 (ب) 9 (ج) 12 (د) 24
- ١٧) إذا كانت : $D(3 - x) = 3 - x$ فإن : $D(5) =$
 (أ) 3 (ب) 9 (ج) 27 (د) 81
- ١٨) نه $\frac{1}{x} = \frac{1}{y} = \frac{3 - \sqrt{1 - x^2}}{25 - x^2}$
 (أ) 30 (ب) $\frac{1}{3}$ (ج) $\frac{1}{3}$ (د) $\frac{1}{5}$
- ١٩) في ΔABC إذا كان : $\angle A = 2\angle B + 2\angle C$ فإن : $\angle C =$
 (أ) 120° (ب) 60° (ج) 150° (د) 30°
- ٢٠) إذا كانت : $D(x) = 2 - x$ فإن مجموعة حل المعادلة $D(x) + (1 - x) = 40$ هي
 (أ) $\{2\}$ (ب) $\{4\}$ (ج) $\{8\}$ (د) $\{16\}$
- ٢١) ABC مثلث فيه : $\angle C = (2x)^\circ$ ، $\angle A = 3^\circ$ سم ، $\angle B = 5^\circ$ سم
 فإن : $\angle C =$
 (أ) 4 (ب) 7 (ج) 8 (د) 9
- ٢٢) إذا كان : $D(4) = 4$ فإن : $D(2) =$
 (أ) 2 (ب) $D(4)$ (ج) 4 (د) $\frac{1}{4}$



٢٣ إذا كانت : نهـ $1 = \frac{4 - 2س}{4 - 2س}$ فإن : ٢ =
 $\infty \leftarrow س$

- (١) ٦ (ب) ٨ (ج) ٦- (د) ٨-

٢٤ إذا كانت د دالة فردية وكانت $س \times د - (س - د) \times س^2 = ٨$
 فإن : د (٣) =

- (١) $\frac{1}{3}$ (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) ٣ (د) ٣-

٢٥ مجموعة حل المعادلة : لو $س + ٩ = ١$ في ح هي

- (١) $\{١, ١٠\}$ (ب) $\{١, ٩\}$ (ج) $\{١\}$ (د) $\{٩\}$

٢٦ نهـ $27 - 2(3 + س) = 2س$
 $\infty \leftarrow س$

- (١) ٢٧ (ب) ١٨ (ج) ٩ (د) ٣

٢٧ في أى مثلث $أ$ $ب$ حيكون : $\frac{ما(ب+٩)}{ما+٩} = \frac{ما(٩+ب)}{ما+٩}$
 $\frac{ما(ب+٩)}{ما+٩}$

- (١) $\frac{ح}{٩+ح}$ (ب) $\frac{أ}{٩+ح}$ (ج) $\frac{ب}{٩+ح}$ (د) ١

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الآتيين :

١ مثل بيانياً الدالة د : $د(س) = \left\{ \begin{array}{l} |س| ، س \geq ٠ \\ س^2 ، س < ٠ \end{array} \right.$ ومن الرسم استنتج مدى الدالة

وبين نوعها من حيث كونها زوجية أم فردية أم غير ذلك

٢ أوجد قيمة ٩ التي تجعل الدالة متصلة عند $س = ٢$

حيث د (س) = $\left\{ \begin{array}{l} س - ٢ ، س \leq ٢ \\ س - ٢٢ ، س > ٢ \end{array} \right.$



اختبار
تفاعلي ٨

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) إذا تقاطع منحنى الدالتين د ، د^١ في النقطة (ل^٢ ، ١) فإن : ل =

- (أ) ٤ (ب) ٢ ± (ج) ١ ± (د) ٣ ±

٢) مجموعة حل المعادلة : |٢ س - ١| + ٥ = ٥ في ح هي

- (أ) {٢ ، ٢-} (ب) {٢-} (ج) {٣} (د) ∅

٣) إذا كان : نه^١ = $\frac{١-٢س}{٣-س}$ م فإن : (ل ، م) =

- (أ) (٣ ، ٣) (ب) (٩ ، ٩-) (ج) (٩ ، ٦) (د) (٠ ، ٠)

٤) = $\frac{١}{٣٠} + \frac{١}{٣٠} + \frac{١}{٣٠}$

- (أ) ٣٠ (ب) ١ (ج) ٢ (د) ١-

٥) الدالة الأسية د (س) = ٩ س ، ٠ < ٩ < ١ تكون د (س) < ١ عندما س ∃

- (أ) ح (ب) ح- (ج) ح+ (د) ص

٦) في Δ س ص ع إذا كان : ٦ ما س = ٤ ما ص = ٣ ما ع

فإن : س : ص : ع =

- (أ) ٤ : ٣ : ٢ (ب) ٦ : ٤ : ٣ (ج) ٣ : ٤ : ٦ (د) ٦ : ٣ : ٤

٧) مدى الدالة د (س) = $\frac{٣-س}{س}$ حيث س ≠ ٠ هو

- (أ) ح (ب) ح- {٠} (ج) ح- {١} (د) {٣}

٨) عدد حلول المثلث ٩ ب ح الذي فيه : ح (د) = ٣٠ ، ٩ = ٧ سم ، ١٦ = ب سم

يساوى

- (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) صفر



٩) نهـ $\frac{1}{\infty} = \left(\frac{2}{s} + 3 \right) \dots\dots\dots$

(أ) ∞ (ب) $-\infty$ (ج) صفر (د) ٣

١٠) جميع الدوال التالية أحادية على مجالها ماعدا د (س) = $\dots\dots\dots$

(أ) س (ب) $s + 6$ (ج) s^2 (د) $(s - 2)^2$

١١) مجال الدالة حيث د (س) = لوس - ٦ (٨ - س) هو $\dots\dots\dots$

(أ) $[٨, ٦]$ (ب) $]-٨, ٦[$ (ج) $[٨, ٦[-]٧, \infty[$ (د) $[٨, ٦]$

١٢) إذا كان : $\left(\sqrt[3]{s} \right)^{11-s} = ٩$ فإن : س $\exists \dots\dots\dots$

(أ) $\{3-\}$ (ب) $\{٥\}$ (ج) $\{٣-, ٥\}$ (د) $\emptyset$

١٣) مجموعة حل المتباينة : $|٢ - س| - |٤ - س| - |٢ - س| > ٣$ هي $\dots\dots\dots$

(أ) $]-٥, ١[$ (ب) $]-٥, ١[-]١, ٥[$ (ج) $]-٥, ١[$ (د) $]-٥, ١[$

١٤) إذا كان : ٩ حـ متوازي أضلاع فإن : حـ ٢ + حـ ٣ = $\dots\dots\dots$

(أ) ١ (ب) صفر (ج) ١- (د) $\frac{1}{4}$

١٥) Δ حـ متساوي الأضلاع طول ضلعه ٩ سم فإن مساحة الدائرة المارة برؤوسه

تساوى $\dots\dots\dots \pi$ سم^٢

(أ) $\sqrt[3]{٢٣}$ (ب) $\sqrt[3]{٦٦}$ (ج) ١٨ (د) ٢٧

١٦) إذا كان : Δ حـ محيطه ٢٤ سم وكان : حـ ٢ + حـ ٣ = حـ ٤

فإن : حـ = $\dots\dots\dots$

(أ) ٤ (ب) ٦ (ج) ٨ (د) ٩

١٧) نهـ $\frac{1}{\infty} = \sqrt[2]{٢ - س} \dots\dots\dots$

(أ) ١ (ب) غير موجودة (ج) ٢ (د) صفر

١٨) في المثلث س ص ع إذا كان : س = ص فإن : حـ = $\dots\dots\dots$

(أ) $\frac{٢}{ص}$ (ب) $\frac{٢}{ص}$ (ج) $\frac{ع}{٢ص}$ (د) $\frac{ص}{٢ص}$

١٩) إذا كان : د ، م دالتين حيث د (س) = ٣س + ١ ، م (س) = ٥س - ٢

فإن : (د م) (٢) =

(١) ٣ (ب) ٥ (ج) ٥- (د) ٢-

$$\text{نهـا} = \frac{\text{س}^٥ + \text{س}^٢ - ٣٦}{\text{س}^٢ - ٢} = \dots\dots\dots$$

(١) ٨٠ (ب) ٤ (ج) ٨٤ (د) ٣٦

٢٠) مجموعة حل المعادلة : (٢س - ٢٥) = $\frac{٤}{٣}$ ٨١ في ح هي

(١) {١-} (ب) {٢٦} (ج) {١-، ٢٦} (د) $\emptyset$

٢١) إذا كان : لو ٢ = س ، لو ٣ = ص ، فإن : لو ٦ =

(١) س ص (ب) س + ص (ج) س - ص (د) لو س + لو ص

$$\text{نهـا} = \frac{٤س^٢ - ٢س - ٥}{٣س^٢ - ٩س + ٨} = ٣ \quad \text{فإن : لو ٩ + ٢ =} \dots\dots\dots$$

حيث ٩، ٢ $\in$ ح

(١) ٢ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ٨

$$\text{نهـا} = \frac{٣س^٢ - ٢س - ١}{٣س^٢ + ٢س - ١} = \dots\dots\dots$$

(١) $\frac{٣}{٢}$ (ب) $\frac{٢}{٣}$ (ج) ١ (د) ١-

$$\text{نهـا} = \frac{\text{حـس}}{\pi - \pi} = \dots\dots\dots$$

(١) ١ (ب) π (ج) π (د) $\pi -$

٢٢) إذا كان : لو ٢ لو ٣ = ١ ، فإن : س =

(١) ٩ (ب) ٨ (ج) ٦ (د) ١

$$\text{نهـا} = \frac{١ - ٨\text{حـا}}{٤\text{س}} = \dots\dots\dots$$

(١) ٨ (ب) ٤ (ج) ٢ (د) صفر

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الآتيين :

١) إذا كانت الدالة د (س) = $\begin{cases} ٢س + ٢س - ٢ ، س < ٢ \\ ٢س ، س = ٢ \\ ٥س + ٢س ، س > ٢ \end{cases}$ متصلة عند س = ٢ ، أوجد قيمة : ل ، م



٢ ارسم الشكل البياني للدالة $d(x) = |x^2 - 2x - 3|$ ومن الرسم أوجد مدى الدالة وابحث اطرادها وبين نوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك.



إدارة كفر الباطيخ

محافظة دمياط

٩



اختبار
تفاعلي ٩

أسئلة الاختيار من متعدد

أولاً

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١ نقطة رأس المنحنى $d(x) = |x^2 + 3x - 2|$ هي
 (أ) $(2, 3)$ (ب) $(-2, 3)$ (ج) $(2, -3)$ (د) $(-2, -3)$
- ٢ إذا كانت $d(x) = x^2 - 4x + 3$ دالة أسية فإن $\exists$
 (أ) x (ب) $x - \{1\}$ (ج) $-x$ (د) $+x$
- ٣ نهـ $\frac{1}{2} = \frac{2}{x} = \frac{4}{y}$
 (أ) ١٨ (ب) ٢٢ (ج) ٦ (د) ٢
- ٤ المثلث ABC فيه $\frac{AB}{AC} = \frac{2}{3}$ فإن طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوسه =
 (أ) ٣ (ب) ٦ (ج) ٩ (د) ١٢
- ٥ إذا كانت $d(x)$ دالة مجالها هو $x - \{1\}$ ، مداها $x - \{2\}$ حيث $d(x) = \frac{x^2 - 3x - 2}{x - 1}$ فإن $B =$
 (أ) ٣ (ب) ٢ (ج) ١ (د) ١-
- ٦ نهـ $\frac{1}{2} = \frac{2}{x} = \frac{4}{y}$
 (أ) ٤ (ب) ٢ (ج) صفر (د) $\frac{1}{4}$
- ٧ لو $5 + 2x = 7$
 (أ) لو ٧ (ب) ١ (ج) ٧ (د) صفر
- ٨ إذا كان $d(x) = x^2 + 7x - 1$ فإن $d^{-1}(1) =$
 (أ) ٦ (ب) ٢ (ج) ٢- (د) غير معرفة
- ٩ إذا كان $2 = 4x$ فإن $x =$
 (أ) ٤ (ب) ٢- (ج) $2 \pm$ (د) ٢

$$10) \text{ نهـا } \frac{1 - \sqrt{1 - x}}{1 - x} = \dots\dots\dots$$

- (أ) 6 (ب) غير موجودة. (ج) صفر (د) 7

11) الدالة الأحادية من بين الدوال المعرفة بالقواعد الآتية هي

- (أ) $f(x) = x + 2$ (ب) $f(x) = x^2$
(ج) $f(x) = |x|$ (د) $f(x) = 0$

$$12) \text{ نهـا } \frac{1 + \sqrt{1 - x} + \sqrt{1 - x} + \sqrt{1 - x}}{3 + \sqrt{1 - x} + \sqrt{1 - x}} = \dots\dots\dots$$

- (أ) 2 (ب) 1 (ج) 3 (د) $\frac{1}{3}$

13) مجموعة الحل للمعادلة : $\sqrt{x} = 20$ في ح هي

- (أ) $\{0\}$ (ب) $\{0, -5\}$
(ج) $\{120\}$ (د) $\{120, -120\}$

14) عدد حلول Δ $\sqrt{a} = b$ ح الذي فيه : $\sqrt{a} = 60^\circ$ ، $\sqrt{a} = 7$ سم ، $\sqrt{a} = 9$ سم هو

- (أ) واحد (ب) اثنان (ج) صفر (د) ثلاثة

15) إذا كانت د (ح) دالة حقيقية مجالها $[-2, 3]$ فإن مجال الدالة من (ح) = د (ح - 2) هو

- (أ) $[-2, 3]$ (ب) $[-1, 4]$ (ج) $[0, 5]$ (د) ح

16) قياس أكبر زاوية في المثلث الذي أطوال أضلاعه 6 سم ، 10 سم ، 14 سم يساوي

- (أ) 120 (ب) 150 (ج) 135 (د) 60

$$17) \text{ مجال الدالة د : د (ح) = } \frac{0}{\sqrt{1 - x}} \text{ هو } \dots\dots\dots$$

- (أ) $[-4, \infty)$ (ب) $[-4, \infty]$ (ج) $[-4, \infty)$ (د) $[-4, \infty]$

$$18) \text{ نهـا } \frac{1 - \sqrt{1 - x}}{1 - x} = \dots\dots\dots$$

- (أ) -6 (ب) صفر (ج) 3 (د) 6



١٩ إذا كانت مساحة المثلث $ABC = 12$ سم² فإن : $(A - B + C) = 2$ طأ =

(د) ٩٦

(ج) ٤٨

(ب) ٢٤

(أ) ١٢

٢٠ نه = $\frac{\sqrt{2-4+s}}{s+s^2}$

(د) $\frac{1}{4}$

(ج) $\frac{1}{4} -$

(ب) $4 -$

(أ) ٤

٢١ لو_٣ ٥٤ - لو_٣ $\frac{8}{15}$ + لو_٣ $\frac{4}{5}$ = =

(د) ٣

(ج) ٢٧

(ب) ٤

(أ) لو_٣ ٣

٢٢ إذا كان : $3 = s$ فإن : $3 + s + 2 =$ =

(د) ٩٠

(ج) ٤٥

(ب) ٧

(أ) ٥

٢٣ لو (منا θ) + لو (قا θ) = حيث θ زاوية حادة.


(د) ٢

(ج) ١ -

(ب) ١

(أ) صفر

٢٤ في الشكل المقابل :



نه = $\frac{1}{s-2}$ د (س)

(أ) غير موجودة.

(ب) ١

(ج) ١ -

(د) ٢

٢٥ في المثلث ABC C يكون : منا (س + ص) = =

(ب) منا س + منا ص

(أ) منا س + منا ص

(د) منا ع

(ج) منا ع

٢٦ المثلث ABC فيه : $2 = CA = 6 = AB = 4 = AC$ فإن : $A : B : C =$ =

(د) $4 : 6 : 3$

(ج) $2 : 3 : 4$

(ب) $4 : 3 : 2$

(أ) $3 : 2 : 4$

٢٧ نه = $\frac{1(s-1)}{2-s}$ طأ (س)

(د) ١

(ج) $\frac{1}{3}$

(ب) $\frac{1}{3}$

(أ) ١ -

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الآتيين :

١ إذا كانت : د (س) = $\frac{1}{س}$ فارسم الشكل البياني للدالة م (س) = د (س + ١) ومن الرسم أوجد المجال والمدى وحدد هل الدالة زوجية أو فردية أو غير ذلك.

٢ أوجد قيمتي م ، لـ التي تجعل الدالة د متصلة عند س = ٢ حيث :

$$د(س) = \begin{cases} س^2 + ٣م ، س > ٢ \\ ٧ ، س = ٢ \\ ٥س + لـ ، س < ٢ \end{cases}$$



إدارة بلطيم
توجيه الرياضيات

محافظة كفر الشيخ

١٠



اختبار
تفاعلي ١٠

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كانت : د (س) = $\sqrt{١-س}$ ، م (س) = $\sqrt{١-س}$ فإن : مجال (د + م) هو

(أ) $[-١، ١]$ (ب) $[-١، \infty)$ (ج) $[-١، ١]$ (د) $\{١\}$

٢ في Δ س ص ع إذا كان : ح (د س) : ح (د ص) : ح (د ع) = ٢ : ٣ : ١ فإن : س : ص : ع =

(أ) $١ : ٢ : ٣$ (ب) $١ : ٢ : \sqrt{٣}$ (ج) $١ : \sqrt{٣} : ٢$ (د) $١ : ٣ : ٢$

٣ إذا كان : نهـا $\frac{س-٢}{٣-س} = م$ فإن : (ل ، م) =

(أ) (٣ ، ٣) (ب) (٠ ، ٩) (ج) (٦ ، ٩) (د) (٠ ، ٠)

٤ حاصل ضرب جذرى المعادلة : $س^2 - ٣س - ١٠ = ٠$ يساوى

(أ) ٢٥ (ب) ١٥ (ج) ١٠ (د) ٢٥

٥ نهـا $\frac{س^2 + ٥س + ٣}{س} =$

(أ) ٢ (ب) ١٥ (ج) ٢١ (د) ١٧



- ٦) مجموعة حل المعادلة : $(لو س) - لو س^2 = صفر$ هي
- (أ) $\{١٠، ١\}$ (ب) $\{١٠٠، ١\}$ (ج) $\{١٠٠، ١٠\}$ (د) $\{١٠٠، ٠\}$
- ٧) نهـا $\frac{س^٢ - ٣٢}{س^٢ + ٣س - ١٠} = \dots\dots\dots$
- (أ) ٨٠ (ب) $\frac{٨٠}{٧}$ (ج) $\frac{٧}{٨٠}$ (د) $\frac{١}{٨٠}$
- ٨) إذا كانت : $ه س + ٢ = \sqrt[٤]{١٢٥}$ فإن : س =
- (أ) ٣ (ب) صفر (ج) ١- (د) $\frac{٥}{٤}$
- ٩) عدد الحلول الممكنة للمثلث س ص ع الذي فيه :
- ق (د س) = ٣٠° ، س = ٦ سم ، ص = ٩ سم يساوى
- (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٠ (د) عدد لانهائى
- ١٠) إذا كانت د ، س دالتين حيث د (س) = $س^٢$ ، س (س) = $س + ٢$ فإن : (س د) (س) هي دالة
- (أ) أحادية. (ب) فردية. (ج) زوجية. (د) خطية.
- ١١) نهـا $\frac{س^٢ + س - ٢}{س - ١} = \dots\dots\dots$
- (أ) ٣٠ (ب) ٢٠ (ج) ١٠ (د) ١
- ١٢) مجموعة حل المتباينة : $\sqrt[٢]{س^٢ - ٢س + ١} \leq ٤$ هي
- (أ) $[٥، ٣-]$ (ب) $[-٣، ٥]$ (ج) $[٣-، ٥]$ (د) $[-٣، ٥]$
- ١٣) الدالة د (س) = $|س + ٢|$ تكون تناقصية فى الفترة
- (أ) $٠، \infty$ (ب) $٢، \infty$ (ج) $٢-، \infty$ (د) $٢-، \infty$
- ١٤) إذا كان محيط الدائرة المارة برؤوس Δ ب ح = ٢π سم فإن : أ ق ب + ب ق أ + ح ق أ = سم
- (أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ٨
- ١٥) إذا كان : لو س = $(٦ - س)$ ، فإن : لو (ه س) =
- (أ) ١٠ (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣
- ١٦) مجموعة حل المعادلة : $س - س^٢ - ٢ = صفر$
- (أ) $\{١\}$ (ب) $\{٢، ١-\}$ (ج) $\{٢\}$ (د) $\{١-\}$

١٧ إذا كانت : د (س) = $\left. \begin{aligned} 3س + 2س + 1س - 2 \text{ عند } 3 < س \\ 2س + 1س \text{ عند } 3 > س \end{aligned} \right\}$

وكانت : نهيا د (س) = 16 فإن : 16 = 2س + 1س =

(أ) 4 (ب) 7 (ج) 1- (د) 13

١٨ في المثلث أ ب ح إذا كان : ماب = $\frac{ح}{2}$ فإن : المثلث أ ب ح فيه

(أ) ح = أ (ب) ح = ب (ج) أ = ب (د) 2 = ب

١٩ نهيا س $\rightarrow \infty$ $\frac{1 + 2س - 2س + 2س - 1 + 3س - 2س + 1س - 3س}{3 + 1س - 2س + 3س - 2س + 1س - 3س} = \dots\dots\dots$

(أ) $\frac{1}{3}$ (ب) 2 (ج) 3 (د) $\frac{1}{3}$

٢٠ إذا كان : س = $\frac{2}{3}$ 2 = $\frac{4}{3}$ 32 = فإن : س + ص =

(أ) 16 (ب) صفر (ج) 16 ، 16- (د) صفر ، 16

٢١ أ ب ح مثلث فيه : أ = 2 + ح - 2 + 2 + 2 = 0 فإن : ح (د ح) =

(أ) 30 (ب) 150 (ج) 60 (د) 120

٢٢ الدالة العكسية للدالة : ص = 2س + 1 هي

(أ) س = ص + 1 (ب) ص = 2س + 1

(ج) ص = $\frac{1}{2}س - 1$ (د) ص = $\frac{1}{2}(س - 1)$

٢٣ في المثلث س ص ع يكون : $\frac{2س}{ص} = \dots\dots\dots$ نق

(أ) 1 (ب) 2 (ج) 4 (د) 8

٢٤ نهيا س $\rightarrow \infty$ $\frac{2س - 1}{3س + 2} = \dots\dots\dots$


(أ) $\frac{2}{3}$ (ب) 10 (ج) $\frac{2}{3}$ (د) صفر

٢٥ مجموعة حل المعادلة : 7س = 4س + 9 هو

(أ) {2-} (ب) {2- ، 4} (ج) {2- ، 3} (د) {2- ، 4-}

٢٦ مجال الدالة د : د (س) = لو س س هو

(أ) س < 0 (ب) س > 1 (ج) 0 < س < 1 (د) 0 ≤ س ≤ 1



٢٧ الشكل المقابل هو التمثيل البياني للدالة د

فإن : نهـا د (س) =

(أ) ٢ (ب) ٣

(ج) ١ (د) غير موجودة.

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الآتيين :

١ ارسم منحنى الدالة د : د (س) = $\sqrt{2 - 4س + 4س^2}$ ومن الرسم أوجد مدى الدالة وابحث اطرادها.

٢ نهـا د (س) = $\left(\frac{16 - 4س}{128 - 7س} + \frac{8 - 2س}{32 - 5س} \right)$



إدارة النوبارية
توجيه الرياضيات

محافظة البحيرة

١١

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ مجال الدالة د (س) = $\frac{2}{2 - |س|}$ هو

(أ) $\{2 - \}$ (ب) $\{2 - \} - ع$ (ج) $\{2 \pm \} - ع$ (د) ع

٢ نهـا د (س) = $\frac{2 + س}{4 - 2س}$

(أ) صفر (ب) ١ (ج) ∞ (د) $\infty -$

٣ Δ ٢ ب ح فيه : ٩ = ١٢ ما ٤ فإن محيط الدائرة الخارجة للمثلث = سم

(أ) 2π (ب) 6π (ج) 9π (د) 12π

٤ جميع الدوال الآتية دوال فردية ما عدا د (س) =

(أ) $فنا س$ (ب) $طا س$ (ج) $فا س$ (د) $٣ س$

٥ إذا كانت : نهـا د (س) = $\frac{9 - ٥س}{٤ - س}$ ٨٠ = فإن : ٩ =

(أ) ٢ (ب) ٤ (ج) $2 \pm$ (د) $4 \pm$

٦) Δ أب حرفيه : أ = ٤ سم ، ب = ٥ سم ، ج = ٦ سم ، د = ٧ سم

فإن : ج = سم

(أ) ٤ (ب) ٥ (ج) ٦ (د) ٨

٧) مجموعة حل المعادلة : $(س + ٢) = \frac{٢}{٣} = ٤$ هي

(أ) {٦} (ب) {٩} (ج) {-١٠، ٦} (د) {٩ ±}

٨) نهـ = $\frac{س - \pi}{\pi - س}$ =

(أ) ١- (ب) صفر (ج) ١ (د) π

٩) Δ أب حرفيه : $\frac{أ}{٤} = \frac{ب}{٣} = \frac{٢}{٥}$ فإن : أ : ب : ج =

(أ) ٨ : ٥ : ٦ (ب) ٤ : ٣ : ٥ (ج) ٤ : ٥ : ٣ (د) ٨ : ٦ : ٥

١٠) إذا كانت : د = (٣) ، ٨ = (٣) ، ٣ = (٧) فإن : (د س) (٧) =

(أ) ٣ (ب) ٥ (ج) ٧ (د) ٨

١١) نهـ = $\frac{١ - (١ + س + ٢)}{س - ٣}$ =

(أ) $\frac{٥}{٣}$ (ب) $\frac{١٠}{٣}$ (ج) $\frac{٥}{٣}$ (د) $\frac{٢}{٣}$

١٢) عدد الحلول الممكنة للمثلث أب ح حيث : أ = ٥ سم ، ب = ٦ سم ، ج = (د) = ٦٠ هو

(أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

١٣) لو٢ × ٨ لو٢ ب = =

(أ) ٢ (ب) ٦ (ج) ٩ (د) ١٢

١٤) إذا كان : نهـ = $\frac{(٢ - س) + ٦ - ٥}{٢ - س} = ٢$ فإن : ل + م =

(أ) ٣ (ب) ٥ (ج) ٦ (د) ٢

١٥) Δ أب ح محيطه = ٢٧ سم ، أ : ب : ج = ٤ : ٣ : ٢

فإن : أ = سم

(أ) ٦ (ب) ٨ (ج) ٩ (د) ١٢

١٦) الدالة د (س) = (١ - س) + ٣ تناقصية عندما س $\exists$

(أ) $[-\infty، ١)$ (ب) $[-\infty، ٣)$ (ج) $[١، \infty)$ (د) $[-\infty، ١)$

١٧) إذا كانت : د (س) = $\left\{ \begin{array}{l} ١ < س ، ٢ + س \\ س > ١ ، س + ١ \end{array} \right\}$ وكانت : نهـ : د (س) موجودة

فإن : ٢ - س =

(أ) ٢ (ب) ١ (ج) ١- (د) صفر

١٨) Δ ٢ س ح فيه : ٢ = س فإن : س =

(أ) $\frac{٢}{٢}$ (ب) $\frac{٢}{٢}$ (ج) $\frac{٢}{٢}$ (د) $\frac{٢}{٢}$

١٩) إذا كانت : د (س) = $١ + س^٢$ فإن : د^{-١}(٢) =

(أ) ٩ (ب) ٣ (ج) ٢ (د) ١

٢٠) نهـ : د (س) = $\frac{٢ - س^٢ + س^٣}{١ - س}$ =

(أ) ٧ (ب) ٥ (ج) ٣ (د) ٤

٢١) مجموعة حل المعادلة : لو (س + ١) - لو (س - ١) = ٢ لو $\sqrt[٣]{٣}$ هي

(أ) {٣} (ب) {١ ، ٢} (ج) {٢} (د) {٢ ، ٣}

٢٢) نهـ : د (س) = $\frac{س + س^٢ + س^٣}{س - س^٢ + س^٣}$ =

(أ) ٣ (ب) ٤ (ج) $\frac{٢}{٣}$ (د) ١

٢٣) إذا كانت : ٢ = س + ٢ = ٦ فإن : س =

(أ) لو ٢ - ٣ (ب) لو ٢ - ٦ (ج) لو ٣ - ٦ (د) لو ٢ - ٦

٢٤) مجموعة حل المتباينة : $|س - ٣| \leq ٥$ هي حيث (س ∈ ح)

(أ) [٨ ، ٢-] (ب) ح - [٨ ، ٢-] (ج) [٨ ، ٢-] (د) ح - [٢- ، ٨]

٢٥) الدالة الأسية : د (س) = س تكون تناقصية عندما ٢ ∈

(أ) [١ ، ∞) (ب) [صفر ، ١] (ج) [١ ، ∞) (د) [١ ، ١-]

٢٦) مجموعة حل المعادلة : (لو س) + لو س = صفر هي

(أ) {١ ، ١٠} (ب) {صفر ، ١٠٠}

(ج) {صفر ، $\frac{١}{١٠}$ } (د) {١ ، $\frac{١}{١٠٠}$ }

٢٧ إذا كان : لو $3 = x$ ، لو $5 = x$ فإن : لو $15 = \dots$

(أ) $x + 3$ (ب) $x - 3$ (ج) $\frac{x}{3}$ (د) $x - 3$

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الآتيين :

١ ارسم الشكل البياني للدالة $y = (x)$ ومن الرسم عين المدى وابحث الأطراد مبيّناً نوع الدالة من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك.

٢ ابحث اتصال الدالة : $y = (x)$ $\left\{ \begin{array}{l} 1 - \frac{x^2 + 2x - 1}{x} , x < 0 \\ 3 - \frac{x^2}{x} , x \geq 0 \end{array} \right.$ عند $x = 0$ = صفر



إدارة غرب الفيوم
توجيه الرياضيات

محافظة الفيوم

١٢

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ الدالة : $y = (x)$ $3 + (2 - x)^2$ تكون متزايدة في الفترة

(أ) $[-\infty, 2]$ (ب) $[2, \infty]$ (ج) $[-\infty, 2]$ (د) $[2, \infty]$

٢ مدى الدالة : $y = (x)$ $\frac{2x^2 - 2x}{1 - 2x}$ هو

(أ) $\{1, -1\} - \mathbb{C}$ (ب) $\{2, -2\}$

(ج) $\mathbb{C}^+$ (د) $\{2, -2\} - \mathbb{C}$

٣ إذا كانت : $y = (x)$ ، $y = (x)$ دالتين حيث $y = (x)$ ، $y = (x)$ $3 + x = (x)$ ، $y = (x)$

فإن : $(y \circ x)$ هي دالة

(أ) أحادية (ب) فردية (ج) زوجية (د) خطية

٤ إذا كانت M مساحة دائرة وكان x طول نصف قطر الدائرة وكان : $M = \pi x^2$

أى أن M دالة في x فإن مجالها

(أ) $\mathbb{C}$ (ب) $\{0\} - \mathbb{C}$ (ج) $\mathbb{C}^+$ (د) $\mathbb{C}^+$



- ٥) منحنى الدالة : د (س) = |س + ٣| - ٢ متماثل حول المستقيم
- (أ) س = ٣ (ب) س = -٣ (ج) ص = ٣ (د) ص = -٣
- ٦) مجموعة حل المعادلة : $\sqrt[3]{(س - ٣)^0} = ٣٢$ فى ح هى
- (أ) {٢} (ب) {١١} (ج) {١١ ، -٥} (د) {-١١ ، ١١}
- ٧) إذا كانت : د (س) = ٢ - س فإن : د (س) تكون تناقصيه عند س $\exists$
- (أ) ح (ب) ح⁺ (ج) ح⁻ (د) $\emptyset$
- ٨) إذا كانت : د (س) = $\frac{س + ٤}{س + ١}$ وكان : د (٢ ، ٥) $\exists$ فإن : ل =
- (أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ١٣
- ٩) إذا كان : لو س + لو ٢ = ٢ لو فإن : س =
- (أ) ٢ (ب) $\sqrt[3]{٢}$ (ج) $\frac{١}{٢}$ (د) $٢\sqrt[3]{٢}$
- ١٠) مجموعة حل المعادلة : ٢٥ س - ٢٧ × س + ٥٠ = ٥٠ هى
- (أ) ٢ (ب) ٤٣ ، ٠ (ج) {٢ ، ٤٣ ، ٠} (د) {٥ ، ٢}
- ١١) إذا كان : لو $\sqrt[3]{س + ٥} = \frac{١}{٢}$ فإن : س =
- (أ) ٧ (ب) $\sqrt[3]{٧}$ (ج) ٢ (د) ١٢
- ١٢) العدد : ٢٥٣ + ٢٤٣ + ٢٣٣ يقبل القسمة على
- (أ) ١٧ (ب) ٢٩ (ج) ٣٧ (د) ٤٧
- ١٣) مستطيل طولاً بعديه : لو ٨ ، لو ٢٧ سم فإن محيطه = سم
- (أ) ٢ لو ٣٥ (ب) لو ٧٠ (ج) ٣ (د) ٦
- ١٤) إذا كانت : ٢ (٠ ، ١) ، ٣ (٤ ، ٤) ، ح (١ ، ٣) رؤوس مثلث
- فإن : ح (د ح ب) =
- (أ) $\frac{٤}{٥}$ (ب) $\frac{٤}{٥}$ (ج) $\frac{٣}{٥}$ (د) $\frac{٣}{٥}$
- ١٥) نهـ ٢ (٢ ٢) =
 (أ) ٣ (ب) ٦ (ج) ١٢ (د) ٢٣

$$\textcircled{16} \quad \frac{\text{نهـا}}{\text{س} \leftarrow 2} = \frac{(3 + \text{س}) - 0}{\text{س} - 2} = \dots\dots\dots$$

- (أ) $\frac{5}{4}$ (ب) $\frac{5}{4}$ (ج) $\frac{1}{4}$ (د) $\frac{1}{4}$

$$\textcircled{17} \quad \frac{\text{نهـا}}{\text{س} \leftarrow \infty} = \frac{\text{س}}{\text{س}} = \dots\dots\dots \text{ (إذا كانت : ح < و)}$$

- (أ) ح - و (ب) ١ (ج) ∞ (د) صفر

$$\textcircled{18} \quad \frac{\text{نهـا}}{\text{س} \leftarrow 0} = \frac{\text{س}^2}{\text{س}^2 - 4} = \dots\dots\dots$$

- (أ) $\frac{3}{4}$ (ب) $\frac{3}{4}$ (ج) ٣ (د) $\frac{3}{5}$

$$\textcircled{19} \quad \left. \begin{array}{l} 2 - \\ 1 \end{array} \right\} = (\text{س}) \text{ : إذا كانت : د (س) ، } \text{س} < \text{ ، } \text{س} > \text{ ، } \text{فإن : نهـا د (س) = } \dots\dots\dots$$

- (أ) غير موجوده (ب) ٢ - (ج) ١ (د) صفر

$$\textcircled{20} \quad \text{إذا كانت : نهـا د (س) = ل ، نهـا د (س) = م وكانت الدالة متصلة}$$

$$\text{عند س = ٩ فإن : ل}^2 + \text{م}^2 - 2\text{ل م} = \dots\dots\dots$$

- (أ) صفر (ب) ١ - (ج) ١ (د) ٢

$$\textcircled{21} \quad \frac{\text{نهـا}}{\text{س} \leftarrow 1} = \frac{\text{س}^2 - \text{س} - 2}{\text{س} + 1} = \dots\dots\dots$$

- (أ) ٣ (ب) ٢ (ج) ٣ - (د) ٥ -

$$\textcircled{22} \quad \text{إذا كانت : نهـا} \frac{\text{س}^2 + 1}{\text{س} - 1} = \frac{\text{س}^2 - 0}{\text{س} - 2} \text{ فإن : ل} = \dots\dots\dots$$

- (أ) ٣ (ب) ٣ - (ج) ١ - (د) $3 \pm$

$$\textcircled{23} \quad \Delta \text{ أ ح فيه : ح (د) : ح (د) : ح (د) = ٢ : ٣ : ٤ ، ح = ١٢ سم}$$

$$\text{فإن : ح} \approx \dots\dots\dots \text{ سم}$$

- (أ) ١٠ (ب) ١١ (ج) ١٦ (د) ١٨

$$\textcircled{24} \quad \text{إذا كان طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوس } \Delta \text{ أ ب ح = ٣ سم}$$

$$\text{وكان : ح أ + ح ب + ح ج = ٢ فإن : محيط } \Delta \text{ أ ب ح = } \dots\dots\dots \text{ سم}$$

- (أ) ٦ (ب) ٩ (ج) ١٢ (د) ٢٤



- (٢٥) Δ س ص ع فيه : ٢ س ص مّا (س + ص) =
 (أ) س^٢ + ص^٢ - ع^٢ (ب) ص^٢ + ع^٢ - س^٢
 (ج) س^٢ - ع^٢ - ص^٢ (د) ع^٢ - س^٢ - ص^٢
- (٢٦) Δ س ص ع فيه : ع^٢ = (س + ص) - س ص فإن : ع (د ع) =
 (أ) ٣٠ (ب) ٤٥ (ج) ٦٠ (د) ١٢٠
- (٢٧) عدد الحلول الممكنة للمثلث أ ب ح الذي فيه : ع (د) = ١١٢ ، ٧ = سم
 ، ع = ٤ سم هو
 (أ) ١ (ب) صفر (ج) ٢ (د) لا نهائي

الأسئلة المقالية

ثانياً

أجب عن السؤالين الآتيين :

- ١ إذا كانت : د (س) = $\left\{ \begin{array}{l} ١٥ \text{ ماس} + \frac{\text{ماس}}{\text{س}} ، \text{ س} < ٠ \\ \frac{\text{س} - ٦}{٨ - \text{س}} ، \text{ س} > ٠ \end{array} \right\}$
 وكانت لها نهاية عند س = ٠ أوجد قيمة :

- ٢ أوجد في ح مجموعة حل المتباينة : $\sqrt{(س + ٢) + ٤} + ٢ |س + ٤| \geq ٦$ جبرياً



إدارة مالوى
توجيه الرياضيات

محافظة المنيا

١٣

أسئلة الاختيار من متعدد

أولاً

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١ مجال الدالة د : د (س) = $\sqrt{٩ + \text{س}^٢}$ هو
 (أ) ح (ب) {٣- ، ٣} (ج) {٣- ، ٣} (د) ح - {٩-}
- ٢ مجموعة حل المعادلة : $|س| + ٧ = ٥$ هي حيث س $\in$ ح
 (أ) {٢-} (ب) {١٢} (ج) $\emptyset$ (د) {٢}
- ٣ نها مّا س^٢ + ٣ س^٢ =
 (أ) ٦ (ب) ٨ (ج) ١٢ (د) ١١

٤) مجموعة حل المعادلة : $٢٣ - س = ١٠ \times س + ٩ =$ صفر في ح هي

- (١) $\{٠\}$ (ب) $\{٢\}$ (ج) $\{٣-\}$ (د) $\{٢, ٠\}$

٥) إذا كان س ص ع مثلث فيه : $٢ ما س = ٤ ما ص = ٣ ما ع$
فإن : ح (د ص) =

- (١) $٦٣, ٦١$ (ب) $٥٥, ٢٣$ (ج) $٣٦, ٣٤$ (د) $٢٦, ٢٨$

٦) نهـا $\frac{س + ٢ - ١٠}{س - ٢} = \dots\dots\dots$

- (١) ١٥ (ب) ١٤ (ج) ١٣ (د) ١٢

٧) إذا كان محيط الدائرة المارة برؤوس المثلث : أ ب ح = ٢π سم

فإن : أ ق + ب ق + ح ق = سم

- (١) ٢ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ٨

٨) الدالة الأحادية من بين الدوال الآتية هي حيث س $\in$ ح

- (١) د (س) = $|٧ + س|$ (ب) د (س) = $١ + س$

- (ج) د (س) = $٢ س$ (د) د (س) = $٣ س^٢$

٩) إذا كانت د دالة زوجية ، $\exists$ مجال د فإن : د (٢) - د (٢-) =

- (١) صفر (ب) ٤ (ج) $٢ (٢-)$ (د) $٢ (٢)$

١٠) إذا كانت : د (س) = $٢ س + ١$ ، س (س) = $\sqrt{٣ + س}$

فإن : (د $\circ$ س) (٦) =

- (١) ٤ (ب) ٧ (ج) ١٣ (د) ٣

١١) مجموعة حل المتباينة : $|٢ + س| > ٦$ في ح تساوى

- (١) $]-٨, ٤[$ (ب) $]-٨, ٤[$

- (ج) $\{٨, ٤\} -$ ح (د) $]-٨, ٤[$

١٢) نهـا $\frac{س - ٢٣}{س - ٣} = \dots\dots\dots$

- (١) ٩ (ب) ٣ (ج) $٣-$ (د) $٩-$

١٣) عدد الطول الممكنة للمثلث س ص ع الذي فيه : ح (د س) = ٣٠° ، س = ٦ سم

ص = ٩ سم يساوى

- (١) ١ (ب) ٢ (ج) صفر (د) عدد لا نهائى



- ١٤) في المثلث ABC إذا كان : $\angle A = 20^\circ$ سم ، $\angle C = 16^\circ$ سم ، $AB = \frac{2}{5}$ فإن : $BC = \dots$ سم
 (أ) ٢٠ (ب) ١٦ (ج) ٢٥ (د) ١٥
- ١٥) إذا كان : $\sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{4}$ فإن : $x = \dots$
 (أ) $2 \pm$ (ب) ١ (ج) ٣ (د) ٤
- ١٦) مجموعة حل المعادلة : $(لو س) - ٢ = ٢ لو س$ = صفر هي
 (أ) $\{1, 10\}$ (ب) $\{1, 100\}$ (ج) $\{1, 10, 100\}$ (د) $\{0, 100, 1000\}$
- ١٧) المثلث ABC حافته : $\frac{AB}{3} = \frac{2}{5} = \frac{AC}{4}$ فإن : $\angle C : \angle B : \angle A = \dots$
 (أ) ٨ : ٥ : ٦ (ب) ٨ : ٥ : ٦ (ج) ٧ : ٢ : ٤ (د) ٣ : ٥ : ٤
- ١٨) الدالة العكسية للدالة $ص = ٢ س + ١$ هي
 (أ) $س = ص + ١$ (ب) $ص = ٢ س + ١$
 (ج) $ص = \frac{1}{٢} س - ١$ (د) $ص = \frac{1}{٢} (س - ١)$
- ١٩) نهـ $\frac{81 - (٣ + س)^٤}{س} = \dots$
 (أ) ١٠٨ (ب) ٧٢ (ج) ٣٦ (د) ٣٢٤
- ٢٠) نهـ $\frac{٨ + س - ٦ س - ٢ س - ٢ س - ٥ س}{٦ + س} = \dots$
 (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ١- (د) ٤
- ٢١) لو ٣ $\times ٥$ لو ٣ $\times ٣$ لو ٥ = ١٦
 (أ) ٣٠ (ب) ١٥ (ج) لو ١٠٠٠ (د) لو ٣ ٢٤٠
- ٢٢) إذا كان عدد سكان إحدى المدن الآن هو ١٠٠٠٠٠ نسمة ، ويتناقص بنسبة ٥ % سنوياً فإن عدد السكان المتوقع بعد ١٠ سنوات تقريباً هو
 (أ) ٧٥٩٨٣ (ب) ٥٩٨٧٤ (ج) ٩٨٧٣٥ (د) ٣٥٩٨٧
- ٢٣) نهـ $\frac{٣ س - ٢ س - ٥ س}{٣ س - ٢ س} = ٦$ فإن : $٦ = \dots$
 (أ) ١٨ (ب) ١٢ (ج) ٤- (د) ٦-
- ٢٤) طول قطر الدائرة الخارجة عن المثلث المتساوي الأضلاع الذي طول ضلعه $٤\sqrt{3}$ سم يساوى سم
 (أ) $٢\sqrt{3}$ (ب) $٤\sqrt{3}$ (ج) ٤ (د) ٨

$$\textcircled{25} \quad \frac{8-s}{4-s} = \frac{8-s}{4-s} \dots\dots\dots$$

(أ) ٢ ، (ب) ٣ ، (ج) ٦ ، (د) ١٢

\textcircled{26} إذا كان : لو $s = 3$ ، لو $s = 10$ ، فإن : لو $s = 100$

(أ) ١٥ س ص (ب) $s + 1$ ص (ج) $s + 10$ ص (د) $s + 100$ ص

\textcircled{27} إذا كان : د (س) = $\left\{ \begin{array}{l} s+1, s > 3 \\ s-3, s \leq 3 \end{array} \right.$ فإن : نه $\frac{1}{s}$ د (س) =

(أ) ٨ ، (ب) ١٠ ، (ج) ١٢ ، (د) ١٤

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الآتيين :

\textcircled{1} ارسم الشكل البياني للدالة د (س) = $\frac{1}{s-3} + 3$ ومن الرسم عين مجال الدالة ومدى الدالة واطراد الدالة وهل الدالة زوجية ام فردية ام غير ذلك.

\textcircled{2} ابحث اتصال الدالة : د (س) = $\left\{ \begin{array}{l} s+4, s \geq 3 \\ s-5, s < 3 \end{array} \right.$ عند $s = \frac{1}{3}$



إدارة سوهاج
توجيه الرياضيات

محافظة سوهاج

١٤

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

\textcircled{1} مجال الدالة د : د (س) = $\sqrt{s-3}$ هو

(أ) $[-2, \infty)$ (ب) $[3, \infty)$ (ج) $[-2, 3]$ (د) $\mathbb{R}$

\textcircled{2} أى من الدوال المعرفة بالقواعد الآتية زوجية : د (س) =

(أ) s^2 (ب) s^3 (ج) $s^2 + 2$ (د) $s^3 + 1$

\textcircled{3} نقطة رأس المنحنى للدالة د (س) = $s^2 + 2s + 1$ هي

(أ) (١ ، صفر) (ب) (-١ ، صفر) (ج) (صفر ، -١) (د) (صفر ، ١)

٤) إذا كان : د (س) = $س^2 + ٢$ فإن : د (١) =

- (أ) ٣ (ب) ٩ (ج) ١١ (د) ٧

٥) التمثيل البياني للدالة $س = |س - ٦| + ١$ هو نفس التمثيل البياني للدالة
د (س) = $|س|$ بإزاحة مقدارها ٦ وحدة طول في اتجاه $\leftarrow$ وإزاحة مقدارها ١
وحدة طول في اتجاه $\leftarrow$ فإن : د - ٢ =

- (أ) ٥- (ب) ٥ (ج) ١ (د) ١-

٦) مجموعة حل المتباينة : $٢ \sqrt{س^2 - ٦س + ٩} - ٣س - ٥ < ٥$

في ح هي

- (أ) $\emptyset$ (ب) ح (ج) $\{٣\}$ (د) $ح - \{٣\}$

٧) إذا كان : د (س) = $س^2$ ، د (س + ١) + د (س - ١) = ١٠ فإن : س =

- (أ) ٢ (ب) ٢- (ج) $٣ \pm$ (د) $٢ \pm$

٨) الدالة : د (س) = $س^٢$ تكون تناقصية على مجالها ح عندما

- (أ) $١ = ٢$ (ب) $١ < ٢$ (ج) $١ > ٢$ (د) $١ = ٢$

٩) إذا كان : لو س = ٢ ، لو ص = ٣ فإن : لو س ص =

- (أ) ٥ (ب) ٦ (ج) $\frac{٣}{٢}$ (د) $\frac{٢}{٣}$

١٠) مجموعة حل المعادلة : $لو |س| = ١$ في ح هي

- (أ) $\{١, -١\}$ (ب) $\{١, ٠\}$ (ج) $\{١, \pm\}$ (د) $\{١, \pm\}$

١١) إذا كان : د (س) = $س^2 + ١$ فإن : د^{-١}(٢٥) =

- (أ) ١٢ (ب) ١٥ (ج) ٤ (د) ٣

١٢) إذا كان : لو س = $س + ١$ + لو س = $س - ١$ ، لو م = ٨ فإن : س =

- (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) $٢ \pm$ (د) $٣ \pm$

١٣) لو س = $س + ٦$ ، فإن : لو س =

- (أ) ٢- (ب) ٣ (ج) ١ (د) $\frac{١}{٢}$

١٤) نه س = $\frac{س^2 + ٥س + ٣}{س^2 - ١}$ =

- (أ) $\frac{١}{٢}$ (ب) $\frac{٣}{٤}$ (ج) ٥ (د) غير موجوده

١٥) نهـ $\frac{27-2}{3-2} = \frac{25}{1}$ (أ) ٣ (ب) ٦ (ج) ٩ (د) ١٨

١٦) إذا كانت : نهـ $\frac{2-\sqrt{2+2}}{2} = \frac{2-\sqrt{4}}{2} = \frac{2-2}{2} = 0$ فإن : (أ) ٨ (ب) ٤ (ج) ٣ (د) $\frac{4}{3}$

١٧) نهـ $\frac{256-7}{96-3} = \frac{249}{93} = \frac{83}{31}$ (أ) $\frac{56}{15}$ (ب) $\frac{5}{7}$ (ج) $\frac{28}{5}$ (د) $\frac{28-}{5}$

١٨) نهـ $(2+2+2+2+2) = 10$ (أ) ٢ (ب) ١٠ (ج) ∞ (د) غير موجودة

١٩) نهـ $\sqrt{3-2} = 1$ (أ) صفر (ب) ١ (ج) ١- (د) غير موجودة

٢٠) نهـ $\frac{2+2+2+2+2}{2} = 5$ (أ) $\frac{3}{5}$ (ب) $\frac{1}{5}$ (ج) ١ (د) غير موجودة

٢١) نهـ $\frac{1+2-2}{7-2} = \frac{1}{5}$ (أ) ٣ (ب) $\frac{1}{3}$ (ج) $\frac{1}{7}$ (د) غير موجودة

٢٢) إذا كان طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوس ΔABC حيساوى ٢ سم فإن : $\left[\frac{A+B+C}{A+B+C} + \frac{A}{A} + \frac{B}{B} + \frac{C}{C} \right] - \frac{A+B+C}{A+B+C} = 3$ (أ) ٦٤ (ب) ١٦ (ج) صفر (د) ٤٨

٢٣) عدد حلول ΔABC الذى فيه : $A = 8^\circ$ سم ، $B = 10^\circ$ سم ، $C = 42^\circ$ هو : (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) صفر

٢٤) ΔABC فيه : $C = 120^\circ$ ، $B = 3^\circ$ سم ، $A = 5^\circ$ سم فإن محيط المثلث : (أ) ١٥ (ب) ١٦ (ج) ١٧ (د) ١٨



٢٥) إذا كان Δ ب ح فيه : ح (د) : ح (ب) : ح (د) ح = ٩ : ٥ : ٤ ، $\angle = ٨$ سم

فإن طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوسه =

(أ) ٨ (ب) ٤ (ج) ١٦ (د) ١٢

٢٦) Δ ب ح فيه : $\angle = \angle + \angle - \angle$ فإن : ح (د) $\exists$

(أ) $\{٦٠^\circ, ٣٠^\circ\}$ (ب) $\{٩٠^\circ, ١٥٠^\circ, ٣٠^\circ\}$

(ج) $\{١٥٠^\circ, ٦٠^\circ\}$ (د) $\{١٢٠^\circ, ٦٠^\circ\}$

٢٧) مثلث متساوي الأضلاع طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوسه $\angle$ سم

فإن مساحته =

(أ) ١٨ (ب) ٣٦ (ج) $١٨\sqrt{٣}$ (د) $٣٦\sqrt{٣}$

الأسئلة المقالية

ثانياً

أجب عن السؤالين الآتيين :

١) ارسم منحنى الدالة : د (س) = $٢ - \frac{١}{٣-س}$ ومن الرسم أوجد : مدى الدالة وابحث

اطرادها وبين نوعها من حيث كونها زوجية ام فردية ام غير ذلك.

٢) إذا كانت الدالة : د (س) = $\left\{ \begin{array}{l} \frac{٣٢-س}{٨-س} \\ ٢-س \end{array} \right\}$ عندما $س \leq ٢$ عندما $س > ٢$

متصلة عند $س = ٢$ أوجد : قيمة ؟

حمل الآن

مجانا وحصريا

امتحانات رقم (3)

الترم الاول





إدارة حقائق القبة
توجيه الرياضيات

محافظة القاهرة

١



اختبار
تفاعلي ١

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) مجال الدالة $d : d(s) = \frac{\sqrt{2-s}}{3-s}$ هو

(أ) $\mathbb{R}$ (ب) $\{3\}$

(ج) $]-\infty, 2]$ (د) $]-\infty, 2] - \{3\}$

٢) الدالة الفردية من بين الدوال المعروفة بالقواعد الآتية هي

(أ) $d(s) = s \sin s$ (ب) $d(s) = s \cos s$

(ج) $d(s) = s$ (د) $d(s) = s \sin s$

٣) نقطة رأس منحنى الدالة $d : d(s) = s^2 + 3$ هي

(أ) $(0, 3)$ (ب) $(3, 0)$ (ج) $(-3, 0)$ (د) $(0, -3)$

٤) مجموعة حل المتباينة $|3 - 2s| \geq 1$ في $\mathbb{R}$ هي

(أ) $[1, 2]$ (ب) $[1, 2[$

(ج) $]2, 1]$ (د) $]2, 1] - \mathbb{R}$

٥) إذا كانت $d : d(s) = 3$ ، $s = (3)$ ، فإن $d(s) = (1)$ =

(أ) 3 (ب) 0 (ج) 10 (د) $\frac{3}{5}$

٦) إذا كان $s^3 - 2s = s^3 - 2s$ ، فإن $s =$

(أ) $\frac{5}{2}$ (ب) 3 (ج) $\frac{2}{5}$ (د) صفر

٧) إذا كانت $s = \sqrt{s}$ فإن الدالة العكسية لها $s =$

(أ) $\frac{1}{s^0}$ (ب) s^0 (ج) $s^0 - 1$ (د) $s^0 s$

٨) إذا كانت $s = 23$ ، $s = 9$ ، فإن $s =$

(أ) 10 (ب) 20 (ج) 0 (د) -0

- ٩) تكون الدالة الأسية التي أساسها ٢ تزايدية إذا كانت
- (أ) $0 < ٢$ (ب) $١ < ٢$ (ج) $١ > ٢ > ٠$ (د) $١ = ٢$
- ١٠) مجموعة حل المعادلة : (لوم ص) $٧ - ٢$ لوم ص $+ ١٢ = ٠$ في ح هي
- (أ) $\{١٢٥, ٢٥\}$ (ب) $\{٦٢٥, ٢٥\}$ (ج) $\{٦٢٥, \frac{١}{٢٥}\}$ (د) $\{٦٢٥, ١٢٥\}$
- ١١) مجموعة حل المعادلة : (لوم ص) $١٢٥ = ٣$ في ح هي
- (أ) $\{٥\}$ (ب) $\{٣\}$ (ج) $\emptyset$ (د) $\{٢\}$
- ١٢) لوم ٥ $\times$ لوم ٣ $\times$ لوم ١٦ =
- (أ) ٣٠ (ب) ١٥ (ج) لو ١٠٠٠٠ (د) لو ٢٤٠
- ١٣) إذا كان : لوم ص $= ٣$ فإن : لوم ٢ =
- (أ) ٢ (ب) $\frac{١}{٣}$ (ج) ٨ (د) ٩
- ١٤) نه $\frac{١٢٨ + ٧}{١٦ - ٤} =$
- (أ) ٩ (ب) ٩- (ج) ١٤- (د) ١٤
- ١٥) نه $\frac{٤٥ - ٢}{٤ - ١ + ٥} =$
- (أ) ٥ (ب) ٦ (ج) ٨ (د) ٤٨
- ١٦) نه $\frac{٣٢ - ٥(٢ + ٥)}{٣} =$
- (أ) ٢٥ (ب) ٦٤ (ج) ٨٠ (د) ١٠٠
- ١٧) نه $\frac{٣(١ + ٢ + ٣)}{٢ + ٣ - ٢} =$
- (أ) ٣ (ب) ٩ (ج) ٢٧ (د) ٨١
- ١٨) نه $\frac{٥ + ٤ + ٩}{٣ + ٤} =$
- (أ) ∞ (ب) ٥ (ج) ٣ (د) ٢

١٩) نهـ = $\frac{٢س + ٣ما}{٥س + ٢طا}$

- (أ) ١ (ب) $\frac{٥}{٧}$ (ج) $\frac{٧}{٥}$ (د) ١ -

٢٠) نهـ = $\frac{س(٣س + ٢ما + ٥س)}{٥س}$

- (أ) ١ (ب) ٣ (ج) ٩ (د) ١٥

٢١) إذا كانت د : د (س) = $\left. \begin{array}{l} \frac{١-٢س}{١-س} \\ ٢٢ \end{array} \right\}$ ، $س \neq ١$ ، $س = ١$

متصلة عند س = ١ فإن : ٩ =

- (أ) صفر (ب) ٢ - (ج) ٢ (د) ١

٢٢) طول قطر الدائرة الخارجة للمثلث المتساوي الأضلاع الذى طول ضلعه ٤ $\sqrt{٣}$ سم

يساوى

- (أ) $٢\sqrt{٣}$ (ب) $٤\sqrt{٣}$ (ج) ٤ (د) ٨

٢٣) $\Delta ل م ن$ فيه : $\frac{ل}{٣} = \frac{م}{٣} = \frac{ن}{٤}$ فإن ل : م : ن =

- (أ) ٣ : ٨ : ٦ (ب) ٨ : ٦ : ٣ (ج) ٦ : ٣ : ٨ (د) ٨ : ٣ : ٦

٢٤) فى $\Delta ا ب ح$ إذا كان : ٣ ما = ٤ ما = ٢ ما فإن جيب تمام أصغر زاوية

فى $\Delta ا ب ح$ =

- (أ) $\frac{١١}{٢٤}$ (ب) $\frac{٤٣}{٤٨}$ (ج) $\frac{٢٩}{٣٦}$ (د) $\frac{١١}{٣٦}$

٢٥) إذا كانت : د تكمل د ح فإن : ٢ ما + ٣ ما =


- (أ) ١ (ب) صفر (ج) $\frac{١}{٣}$ (د) ١ -

٢٦) عدد الحلول الممكنة للمثلث س ص ع الذى فيه :

س (د س) = ٣٠ ، س = ٦ سم ، ص = ٩ سم يساوى

- (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٠ (د) عدد لا نهائى

٢٧ في الشكل المقابل :



$\overline{١٢} \parallel \overline{٢٣}$ ، $\angle ١ = ١٠٠^\circ$ ، $\angle ٢ = ٣٠^\circ$ ، $٢٣ = ٢٠$ سم

، $\angle ٣ = ١٠٠^\circ$ ، $١٢ = ١٢$ سم

فإن مساحة $\Delta ١٢٣ =$ سم^٢ تقريباً.

(د) ١٢٠

(ج) ١٠٤

(ب) ٧٧

(أ) ٦٠

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الآتيين :

١ ارسم منحنى الدالة $د : (س) = \sqrt{٢س - ٤} + س - ٤$ وعين مداها وابحث اطرافها.

٢ ابحث وجود نهاية $د (س) = \begin{cases} ١ + ٢س & \text{لكل } س > ٣ \\ ٣ & \text{عند } س = ٣ \\ ١ + ٣س & \text{لكل } س \leq ٣ \end{cases}$



إدارة العجوة
توجيه الرياضيات

محافظة الجيزة

٢



اختبر
تفاعلي

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كان $لو س + لو ٥ = ٢$ فإن قيمة : $س =$

(د) ٢٠

(ج) ١٧

(ب) ٨

(أ) ٣

٢ في $\Delta ١٢٣$ يكون $\frac{١}{٢} \times \frac{١}{٢} =$

(د) ٢

(ج) ٢ نق

(ب) ١

(أ) ٢ نق

٣ الدالة $د (س) = (س - ٢) - ١$ تزايدية في الفترة

(د) $٢[، \infty$

(ج) $٢ - [، \infty$

(ب) $١[، \infty$

(أ) $١ - [، \infty$

④ إذا كان : $(5) s^2 - s - 2 = 1$ حيث $s < 0$ فإن : $s = \dots\dots\dots$

- (أ) ١ (ب) -٣ (ج) ٢ (د) ٣

⑤ إذا كانت د ، م دالتين حيث د $(s) = s^2$ ، م $(s) = s + 2$

فإن : (م ∘ د) (س) هي دالة

- (أ) أحادية. (ب) فردية. (ج) زوجية. (د) خطية.

⑥ نهـ $\frac{(s+1) - 81}{s-2} = \dots\dots\dots$

- (أ) ١٨ (ب) ٨١ (ج) -١٠.٨ (د) ١٠.٨

⑦ في Δ س ص ع إذا كان : س = ٢٠ سم ، ع = ١٦ سم ، مِثْلا ص = $\frac{2}{5}$

فإن : ص = سم.

- (أ) ٢٠ (ب) ١٦ (ج) ٢٥ (د) ١٥

⑧ مجال الدالة د $(s) = \frac{3}{s-1}$ هو

- (أ) $[-\infty, 1) \cup (0, 1]$ (ب) $[-\infty, 1) \cup (1, \infty]$ (ج) $[1, \infty]$ (د) $[-1, 1]$

⑨ إذا كانت : نهـ $\frac{(3-2)s^2 + 5s - 7}{3s^2 + 5s + 1} = \frac{5}{3}$ فإن قيمة ٢ =

- (أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

⑩ إذا كانت : د $(s) = 4s$ فإن قيمة س التي تحقق العلاقة :

د $(1+s) + د(1-s) = 68$ هي

- (أ) ٤ (ب) ٣ (ج) ٢ (د) ١

⑪ مجموعة حل المعادلة $\sqrt{s^2 + 4s + 4} \leq 7$ في ح هي

- (أ) $[0, 9]$ (ب) $[-9, 0]$ (ج) $[-9, 0] - ح$ (د) $[-9, 0]$

١٢ إذا تقاطع منحنى الدالة d مع منحنى الدالة d^{-1} في النقطة $(٢, ٣)$ فإن :

..... = $d^{-1}(٢)$


(أ) ٢

(ب) ٣

(ج) ٤

(د) ٥

١٣ الشكل المقابل يمثل دالة تربيعية معرفة بالقاعدة $d(x) = \dots$



(أ) $d(x) = (x-2)^2 + 2$

(ب) $d(x) = (x-2)^2 - 2$

(ج) $d(x) = x^2 + 2$

(د) $d(x) = x^2 - 2$

١٤ نهـ ٣ س و ٢ س =

(أ) $\frac{3}{2}$

(ب) $\frac{2}{3}$

(ج) ٦

(د) ٦

١٥ عدد الحلول الممكنة للمثلث ABC الذي فيه $A = ٨$ سم ، $B = ١٠$ سم ، $C = ٤٢^\circ$ هو

(أ) ١

(ب) ٢

(ج) صفر

(د) عدد لا نهائي.

١٦ إذا كانت d دالة فردية وكانت $d(x) + x^2 \times d(-x) = ٢$

فإن : $d(٢) = \dots$

(أ) ٣

(ب) $\frac{1}{3}$

(ج) $٣ -$

١٧ إذا كان محيط $\Delta ABC = ٣٣$ سم ، $AB = ٩$ ، $BC = ٨$ ، $CA = ٦$ فإن طول قطر الدائرة

المارة برؤوسه

(أ) ٥,٥

(ب) ١١

(ج) ٣٣

(د) ٣٠

١٨ في ΔABC إذا كان : $\hat{A} : \hat{B} : \hat{C} = ٣ : ٤ : ٥$ فإن قياس أكبر زواياه =

(أ) ١٢٠

(ب) ٤٥

(ج) ٩٠

(د) ٦٠

١٩) = $\frac{\sqrt{2-2+s}}{2-s}$ نهـ
 (أ) ٤ (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) ٤- (د) $\frac{1}{4} -$

٢٠) = $\frac{128-s^7}{2-s}$ نهـ
 (أ) ٣٢ (ب) ٦٤ (ج) ٤٤٨ (د) ٥١٢

٢١) = $(\theta) + \text{لو} (\theta)$
 (أ) ١ (ب) ٢ (ج) صفر (د) ٣

٢٢) إذا كانت : $h-s = 1$ ، $لوم \times لو = ٢$ فإن قيمة : $s =$
 (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٥ (د) ٣

٢٣) إذا كانت : نهـ = $\frac{s^2 + 2s - 2}{1-s} = \frac{3}{4}$ فإن قيمة : $s =$
 (أ) ٣ (ب) ٢ (ج) ١ (د) صفر

٢٤) إذا كان منحنى الدالة d يمر بالنقطة $(8, 3)$ حيث $d(s) = لوم(s)$
 فإن : $d(4) =$
 (أ) ١ (ب) ٢ (ج) $\frac{1}{4}$ (د) $2-$

٢٥) في ΔABC يكون $\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} =$
 (أ) $[1, 1-]$ (ب) $[1, 1-]$ (ج) $[1, 0]$ (د) $[0, 1-]$

٢٦) = $\frac{1 - \text{منا} s}{s}$ نهـ
 (أ) صفر (ب) ٥ (ج) $\frac{1}{5}$ (د) ٥-

الدالة $d(s) = \frac{1}{\sqrt{2+s}}$ متصلة لكل $s \in$
 (أ) $]-\infty, 2-]$ (ب) $]-\infty, 2-]$ (ج) $]-\infty, 2-]$ (د) $]-\infty, 2-]$

الأسئلة المقالية

ثانياً

أجب عن السؤالين الآتيين :

١ مثل بيانياً الدالة د $(س) = |س - ١| + ٢$ ومن الرسم :

١ أوجد مدى الدالة. ٢ ابحث اطرافها.

٢ إذا كانت د $(س) = \begin{cases} س + ١ & \text{عندما } س < ٢ \\ ٣ - س & \text{عندما } س > ٢ \end{cases}$

وكانت نهياً د $(س)$ موجودة ، فأوجد قيمة : ٢



إدارة الجمرك

محافظة الإسكندرية

٣

أسئلة الاختيار من متعدد

أولاً

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ الدالة د $(س) = (٣ - س) + ٢$ تناقصية في الفترة

(أ) $٣ ، \infty$ (ب) $٢ ، \infty$ (ج) $٣ ، \infty$ (د) $٢ ، \infty$

٢ Δ ٢ حرفيه : ٢ = ١٣ سم ، ٢ = ١٥ سم ، ٢ (د) = ٨٧°

فإن : ٢ = سم.

(أ) ١٥ (ب) ١٦ (ج) ١٨ (د) ١٩

٣ نهياً د $(س) = \frac{٣٢ + س}{٢٢ + س} - ٨$ فإن : ٢ =

(أ) ٩ (ب) ٢٧ (ج) ٣ ± ٣ (د) $٢٧ \pm$

٤ إذا كانت د $(س) = \frac{٢ + س}{١ - س}$ وكانت $(٢ ، ٥) \ni د$ فإن : ٢ =

(أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

٥ نهياً د $(س) = \frac{٧(٥ + س) - ٧س}{٣}$ فإن : ٢ =

(أ) صفر (ب) $\frac{٧}{٣} س$ (ج) $\frac{٣٥}{٣} س$

٦) مساحة مثلث الذى أطوال أضلاعه ١٤ سم ، ١٥ سم ، ١٧ سم يساوى سم تقريباً.

- (أ) ١٢ (ب) ١٣ (ج) ١٥ (د) ١٠٠

٧) إذا كان $٣س = ٤$ فإن : $س =$

- (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٩

٨) إذا كانت $د (س) = \begin{cases} ٤س + ٥ & , س \geq ٢ \\ ٩ - س & , س < ٢ \end{cases}$

متصلة عندما $س = ٢$ فإن : $٩ + س =$

- (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

٩) أى العبارات الآتية صحيحة ؟

(أ) $٦ لو = ٣ لو + ٣ لو$ (ب) $١ - ٢ لو = ٢ لو$

(ج) $٢ لو \times ٢ لو = ٤ لو$ (د) $٣ لو (١ + ٢ + ٣) = ١ لو \times ٢ لو \times ٣ لو$

١٠) ΔABC فيه : $\angle A = ٢٧^\circ$ ، $\angle C = ٥٢^\circ$ وطول قطر دائرته الخارجية ٢٠ سم فإن محيط $\Delta ABC \approx$ سم.

- (أ) ٤٤ (ب) ٤٠ (ج) ٢٦ (د) ٣٢

١١) إذا كانت : $د (س) = |س - ٢| + ٤$ فإن مجموعة حل $د (س + ٢) = ٣$ هى

- (أ) $\{٣ ، ٣ -\}$ (ب) $[٣ ، ٣ -]$ (ج) $\{٢ -\} - \mathbb{C}$ (د) $\emptyset$

١٢) نهـ $\frac{(١ - ٢س + ٣س + ١ - ٢س)}{٣س} =$

- (أ) ١ (ب) $\frac{٢}{٣}$ (ج) $\frac{١}{٣}$ (د) صفر

١٣) إذا كان للمثلث ABC حل وحيد حيث $AB = ١٥$ سم ، $\angle C = ٣٠^\circ$

فإن : AC يمكن أن تساوى

- (أ) ٨ ، ٥ (ب) ٨ (ج) ٧ ، ٥ (د) ٧

١٤) مجموعة حل المعادلة : $١٠ - \frac{٤}{٣}س - ٩ + ٢س = ٠$ هى

- (أ) $\{٩ -\}$ (ب) $\{١ ، ٢٧\}$ (ج) $\{١ \pm ، ٢٧ \pm\}$ (د) $\{٢٧ \pm\}$

١٥) إذا كان : لو_٣ لو_٣ (٣ + ٥) = ١ فإن : س =

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

١٦) إذا كانت د (س) = $\frac{١٢٨ - ٧س}{١٦ - ٤س}$ ، $٢ > س$ ، $٢ < س$ ، $٢٢ - س$ }

وكان نهيا د (س) لها وجود فإن : ٩ =

(أ) $\frac{٧}{٢}$ (ب) ٤ (ج) ٧ (د) ٧ -

١٧) مثلث ٢٤ سم وطول نصف قطره دائرته الخارجية ٥ سم

فإن : ما ما ما (٩ + ٢) =

(أ) $\frac{٣}{٢٥}$ (ب) $\frac{٦}{٢٥}$ (ج) $\frac{٩}{٢٥}$ (د) $\frac{١٢}{٢٥}$

١٨) إذا كانت د (س) = $\frac{١}{س}$ ، س (س) = $٩ - ٢س$ فإن : مجال (د س) هو

(أ) {٢، ٠، ٣} (ب) {٣، ٠، ٣} - ج (د) {٣، ٠، ٣} - ج

(ج) {٣، ٣} - ج (د) {٣، ٣} - ج

١٩) إذا كان : نهيا $\frac{١}{س} = \frac{٣ - ٢س}{٣ - ٢س}$ فإن : ٩ =

(أ) ١٨ (ب) ١٢ (ج) ٤ (د) ٦ -

٢٠) مجموعة حل لو_٣ (س + ٣) - لو_٣ س = ٢ في ح هي

(أ) {١٠} (ب) {٣} (ج) {٢} (د) {٣ -}

٢١) إذا كان : ٤ - س - ٢ - ٢ = ٠ فإن قيم س $\exists$

(أ) {١} (ب) {٢، ١ -} (ج) {٢} (د) {١ -}

٢٢) إذا كانت : $٥ + س = \sqrt[٤]{١٢٥}$ فإن : س =

(أ) ٣ (ب) صفر (ج) ١ - (د) $\frac{٥}{٤}$

$$(٢٣) \text{ نهـا } \frac{س \sqrt{١٦-س}}{٨-س} = \dots\dots\dots$$

- (أ) ١١٢ (ب) ٩٦ (ج) $\frac{٨}{٣}$ (د) ٢

$$(٢٤) \text{ مدى الدالة د (س) = نهـا } \frac{س \sqrt{١-س-٢+س}}{١-س} \text{ هو } \dots\dots\dots$$

- (أ) $\{١\}$ (ب) $\mathbb{R}$ (ج) $[١, ١]$ (د) $\{١, -١\}$

(٢٥) إذا كانت النسبة بين قياسات زوايا Δ هي ٨ : ٣ : ١ فإن النسبة بين طول أكبر ضلعين

- (أ) $٢ : \sqrt{٣}$ (ب) $٢ : \sqrt{٦}$ (ج) ٣ : ٨ (د) ٥ : ٨

(٢٦) إذا كانت د دالة أحادية وكان د (٢) = ٣ + د (١) = ١ فإن : د =

- (أ) ١- (ب) ٢- (ج) ٣- (د) ٤-

$$(٢٧) \text{ إذا كانت نهـا } \frac{س}{٣+س+٢} = ١٤ \text{ فإن : } \dots\dots\dots$$

- (أ) $\{١٢\}$ (ب) $\{٤, \frac{١٦}{٣}\}$ (ج) $\{٤, \frac{١٦}{٣}\}$ (د) $\{\frac{١٦}{٣}\}$

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الآتيين :

$$(١) \left. \begin{array}{l} ٣ < س , \quad ٢ + س - ٢ = س \\ ٣ = س , \quad ١٦ \\ ٣ > س , \quad ٢ + س = س \end{array} \right\} \text{ إذا كانت الدالة د (س) = } \dots\dots\dots$$

متصلة ، احسب قيمة : $\frac{١}{س}$

(٢) أوجد مجموعة حل المتباينة : $|٢ - س - ٣| + |٦ - س - ٤| < ١٢$



إدارة قها

محافظة القليوبية

٤



اختبار
تفاعله ٤

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) ٣ لو $٢ + ٣$ لو $٥ = \dots\dots\dots$

(أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٥ (د) ١٠

٢) نهـا $\frac{س٢ + ٤س}{س٢} = \dots\dots\dots$

(أ) $١ -$ (ب) صفر (ج) ١ (د) ٢

٣) لأى مثلث Δ ٢ ح إذا كان : $٤ = ٢$ فإن : ٢ $\dots\dots\dots$

(أ) $\frac{٢}{٤}$ (ب) $\frac{٢}{٢}$ (ج) $\frac{٢}{٢}$ (د) $\frac{٢}{٢}$

٤) الدالة الأحادية من الدوال الآتية هي $\dots\dots\dots$

(أ) $٢ + س = (س)$ (ب) $٣س = (س)$

(ج) $٣ + س = (س)$ (د) $٤ = (س)$

٥) إذا كانت $د (س) = \left. \begin{array}{l} ٣س٢ + ٤س - ٢ \\ ٢س + ٢ \end{array} \right\}$ عندما $س < ٣$ عندما $س > ٣$

وكانت نهـا $\frac{١}{٢} د (س) = ١٦$ فإن : $٢ + ٤ = \dots\dots\dots$

(أ) ٤ (ب) ١٠ (ج) $١٣ -$ (د) ٧

٦) طول قطر الدائرة الداخلة للمثلث المتساوى الأضلاع الذى طول ضلعه $٤\sqrt{٣}$

يساوى $\dots\dots\dots$ سم.

(أ) $٢\sqrt{٣}$ (ب) $٤\sqrt{٣}$ (ج) ٤ (د) ٨

٧) إذا كانت : $د (س) = ٢س٢ + ٥س + ٦$ ، $ر (س) = ٢س + ٣$ فإن : $\frac{د}{ر} (٣) = \dots\dots\dots$

(أ) $٣ -$ (ب) ١ (ج) $١ -$ (د) غير معروف.

٨) إذا كان : $\left(\frac{١}{٢}\right)^{٢-٤-٦} = ١$ حيث $٢ < صفر$ فإن : $٢ = \dots\dots\dots$

(أ) ٣ (ب) $٣ -$ (ج) ٢ (د) ١

٩) نهـا $\frac{س^2 - ٧س + ١٢}{س - ٣} = \dots\dots\dots$

(أ) ٣- (ب) ٢- (ج) ١- (د) ١

١٠) في Δ ا ب ح فإن : حنا (أ + ب) = $\dots\dots\dots$

(أ) $\frac{س^2 + ح^2 - ٢س}{س - ٢}$ (ب) $\frac{س^2 + ح^2 - ٢س}{س - ٢}$

(ج) $\frac{س^2 + ح^2 - ٢س}{س - ٢}$ (د) $\frac{س^2 + ح^2 - ٢س}{س - ٢}$

١١) نقطة تماثل منحنى الدالة د : د (س) = (س - ٣) + ٢ هي $\dots\dots\dots$

(أ) (٢ ، ٣) (ب) (٣- ، ٢) (ج) (٣- ، ٢-) (د) (٣- ، ٢-)

١٢) لوم س ÷ لوم س = $\dots\dots\dots$

(أ) ١ - لوم ب (ب) ١ + لوم ب (ج) ١ - لوم ب (د) ١ + لوم ب

١٣) نهـا $\frac{س^2 - ٥س}{س^2 + ٣س - ٤} = \dots\dots\dots$

(أ) ٢٥ (ب) ٣٠ (ج) ٦ (د) ٥

١٤) مجال الدالة د : د (س) = $\sqrt{\frac{س - ٥}{س + ٤}}$ هو $\dots\dots\dots$

(أ) $[٥ ، \infty)$ (ب) $(-\infty ، ٤-]$ (ج) $(-\infty ، ٤-]$ (د) $[٥ ، ٤-]$

١٥) $٣٦ + ٣٠ = \dots\dots\dots$

(أ) ٦ (ب) ٣ (ج) ١١ (د) ٨

١٦) إذا كان : س = ٣ فإن : س + ١ = $\dots\dots\dots$

(أ) ١٣ (ب) ١٦ (ج) ٢٤ (د) ٣٦

١٧) في Δ ا ب ح المقدار $س^2 + ح^2 - ٢س$ حنا = $\dots\dots\dots$

(أ) $س^2 + ح^2$ (ب) $س^2 + ح^2$ (ج) $س^2 + ح^2$ (د) $س^2 + ح^2$

١٨) نهـا $\frac{س^2 + س - ٢}{س - ١} = \dots\dots\dots$

(أ) ٣٠ (ب) ٢٠ (ج) ١٠ (د) ١

١٩) إذا كان : لو (س + ٣) = ١ فإن : س = $\dots\dots\dots$

(أ) ١٠ (ب) ٧ (ج) ٣ (د) صفر

٢٠) قيمة لو ٣ - ٥٤ - لو ٣ + ٨/١٥ + لو ٣ = ٤/٥

- (أ) لو ٣ (ب) ٤ (ج) ٢٧ (د) ٣

٢١) نها $\left(\frac{٣س٢ + ٢س١ + ٤}{٢س٣ - ٢س١ + ٤} \right)$ =

- (أ) ٣ (ب) ٩ (ج) ٢٧ (د) ٨١

٢٢) مجموعة حل المعادلة $\sqrt{٢س - ٦س + ٩} + ٢س = ٩$ في ح تساوى

- (أ) {٤، ٦} (ب) {٦} (ج) {٤} (د) $\emptyset$

٢٣) إذا كانت: $٢س - ٢س - ٢س = ١$ حيث $١ < ٢$ فإن: س =

- (أ) ٢ (ب) لو ٢ (ج) لو ٢ (د) لو ٢

٢٤) في Δ ا ب ح إذا كان: $\frac{ما}{٤} = \frac{ما}{٥} = \frac{ما}{٣}$ فإن أ : ب : ج =

- (أ) ٨ : ٥ : ٦ (ب) ٨ : ٥ : ٦ (ج) ٣ : ٤ : ٥ (د) ٤ : ٥ : ٣

٢٥) نها $\frac{٢س٢}{٣س٢} =$

- (أ) ٢/٣ (ب) ٢- (ج) ٦ (د) ٤/٩

٢٦) نها $\frac{١ - ح١س + ط١س}{١ - ح١س - ط١س} =$

- (أ) ٥ (ب) ٥- (ج) صفر (د) غير معرفة.

٢٧) في Δ ا ب ح إذا كان: $٧٦ = (ب)$ ، $١٢ = ح$ ، $١٠ = أ$ سم

يكون س =

- (أ) ١٢,٦ (ب) ١٣,٦ (ج) ١٤,٦ (د) ١٥,٦

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الآتيين :

١) أوجد قيمة أ التي تجعل الدالة د متصلة عند أ

حيث د (س) = $\begin{cases} ٢س - ٢س & \text{عندما } س \leq ٢ \\ س & \text{عندما } س > ٢ \end{cases}$

٢) إذا كانت: د (س) = ٥ س فأوجد في ح مجموعة حل المعادلة د (س) + د (١ - س) = ١٥٠



اختبار
تفاعلي ٥

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) في Δ ب ح إذا كان : $\hat{A} = 4^\circ$ ، $\hat{B} = 19^\circ$ سم ، $\hat{C} = 19^\circ$ سم

، $\hat{C} = (د ح) = 46^\circ$ فإن : $\hat{C} = \dots\dots\dots$ سم

(أ) ١٣, ٧٩ (ب) ١١, ٢٥ (ج) ١٠, ٢٨ (د) ٩, ٨٨

٢) في Δ س ص ع إذا كان : $\hat{S} = 2^\circ$ ، $\hat{V} = 4^\circ$ ، $\hat{C} = 3^\circ$ فإن : $\hat{C} = (د ص) = \dots\dots\dots$

(أ) ٦٣, ٦١ (ب) ٥٥, ٢٣ (ج) ٣٦, ٣٤ (د) ٢٦, ٣٨

٣) في Δ ل م ن يكون $\hat{M}$: $\hat{L}$: $\hat{N} = (ل + ن) : \dots\dots\dots$

(أ) $\hat{L} : (\hat{L} + \hat{M})$ (ب) $\hat{L} : \hat{M}$ (ج) $\hat{L} : \hat{N}$ (د) $\hat{N} : \hat{M}$

٤) نهـ $\frac{\text{س} + ٢ + \text{س} + ٤}{\text{س} + \text{س} + \text{س} + ٤} = \dots\dots\dots$

(أ) ٠ (ب) ١ (ج) ٣ (د) ٤

٥) نقطة تقاطع منحنى الدالة $d = (س) = لو$ ، $(س - ١)$ مع محور السينات هي $\dots\dots\dots$

(أ) (٠ ، ٢) (ب) (٢ ، ٠) (ج) (٠ ، ١) (د) (١ ، ٠)

٦) مجموعة حل المعادلة $|س - ٢| + ٣ = ١$ في ح هي $\dots\dots\dots$

(أ) $\{٤ ، ٠\}$ (ب) $\{٢ - ، ٠\}$ (ج) $\{٤ ، ٢ -\}$ (د) $\emptyset$

٧) نهـ $\frac{\text{س} + ٥}{\text{س} + ٢ + \text{س} + ٥} = \dots\dots\dots$

(أ) صفر (ب) ٢, ٥ (ج) ٥ (د) غير موجودة.

٨) نهـ $\frac{\text{س} + ٦}{\text{س} + ٢ + \text{س}} = \dots\dots\dots$

(أ) ١٢ (ب) ٣ (ج) صفر (د) غير موجودة.

٩) طول نصف قطر الدائرة الخارجة للمثلث المتساوي الأضلاع طول ضلعه ١٢

يساوى $\dots\dots\dots$ سم.

(أ) $٣\sqrt{٨}$ (ب) $٣\sqrt{٤}$ (ج) ٨ (د) ٤

١٠) نها $\lim_{s \rightarrow \infty} (3 - s^{-1} + 7) = \dots\dots\dots$

- (أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٧ (د) ∞

١١) نقطة تماثل الدالة $d(s) = (s - 2)^2 + 3$ هي $\dots\dots\dots$

- (أ) (٣ ، ٢) (ب) (٢ ، -٣) (ج) (-٢ ، ٣) (د) (٠ ، -٣)

١٢) إذا كان: $3^{23} - 81 = 0$ فإن: $\dots\dots\dots$

- (أ) ٨١ (ب) ٢٧ (ج) ٤ (د) ٣

١٣) مجال الدالة $d(s) = \text{لو } s$ هو $\dots\dots\dots$

- (أ) $\mathcal{C}$ (ب) $\mathcal{C}^+$ (ج) $\mathcal{C} - \{1\}$ (د) $\mathcal{C}^*$

١٤) إذا كانت $d(s) = 5s$ ، $d(s - 1) = 125$ فإن: $s = \dots\dots\dots$

- (أ) ١٢٦ (ب) ٥ (ج) ٤ (د) ٣

١٥) مجموعة حل المتباينة $|s - 3| < 2$ في $\mathcal{C}$ هي $\dots\dots\dots$

- (أ) $[5, 1]$ (ب) $[1, 5]$ (ج) $\mathcal{C} - [1, 5]$ (د) $\mathcal{C} - [1, 5]$

١٦) عدد الحلول الممكنة للمثلث s ص ع فيه u (دس) = 60° ، $s = 5$ سم

، $s = 3$ سم هو $\dots\dots\dots$

- (أ) ٠ (ب) ١ (ج) ٢ (د) عدد لا نهائي.

١٧) إذا كانت د دالة حيث $d(5) = 7$ فإن: $d^{-1}(7) = \dots\dots\dots$

- (أ) ٥ (ب) ٧ (ج) ١٢ (د) ٣٥

١٨) نها $\lim_{s \rightarrow \frac{32}{2}} \frac{s - 32}{s - 2} = \dots\dots\dots$

- (أ) ٥ (ب) ٣٢ (ج) ٨٠ (د) ١٦٠

١٩) الدالة الزوجية من بين الدوال المعرفة بالقواعد الآتية هي $d(s) = \dots\dots\dots$

- (أ) $s + s$ (ب) s^2 (ج) $s + s^2$ (د) $s + s^3$

٢٠) إذا كانت $d(s) = 2s - 5$ ، $s = 5$ فإن: $d(s) = \dots\dots\dots$

- (أ) $2s - 5$ (ب) $(2s - 5)^2$ (ج) $2s^2 + 5$ (د) $2(s - 5)^2$

٢١) إذا كانت $d(s) = \left\{ \begin{array}{l} s + 1 \\ s - 2 \end{array} \right.$ ، $s < 2$ فإن: نها $\lim_{s \rightarrow 2} d(s) = \dots\dots\dots$

- (أ) ٣ (ب) ٢ (ج) صفر (د) غير موجودة.

٢٢) في Δ أ ب ح إذا كان : ماب = ٢ ماح ، ٢ = ح ٦ سم فإن : ب = سم.

(أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٦ (د) ١٢

٢٣) نهيا $\frac{س^٢ - ٥س + ٦}{س - ٣} = \dots\dots\dots$

(أ) ١ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٦

٢٤) نهيا $\frac{س^٢ - ٢س - ٨}{س - ٢} = \dots\dots\dots$

(أ) ١-٨ (ب) ٢-٨ (ج) ٢-٨ (د) ١-٨

٢٥) إذا كان : لو ٣ = س ، لو ٥ = ص فإن : لو ١٥ =

(أ) س ص (ب) س - ص (ج) س ÷ ص (د) س + ص

٢٦) إذا كان : س = ٣ = ه فإن : س + ٢ =

(أ) ٥ (ب) ٧ (ج) ٤٥ (د) ٩٠

٢٧) إذا كان : ه = س = ١٧ فإن قيمة س = لأقرب رقمين عشريين.

(أ) ١,٧٦ (ب) ٢,٤٦ (ج) ٣,٤٠ (د) ٥,١٧

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الآتيين :

١) استخدام منحنى الدالة د (س) = |س| لتمثيل الدالة د (س) = ٣ - |س|

ومن الرسم عين مداها وابحث اطرافها

٢) إذا كانت الدالة د (س) = $\frac{س^٧ - ١٢٨}{س^٢ - ٨}$ متصلة في ح أوجد قيمة : ل

، س ≠ ٢ ،
، س = ٢ ،



إدارة نبوة
توجيه الرياضيات
تموذج (أ)

محافظة الدقهلية

٦



اختبار
تفاعلي ٦

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

- ١) الدالة د (س) = |س + ٢| تكون تناقصية في الفترة
 (أ) $[-\infty, ٢]$ (ب) $[-\infty, ٢]$ (ج) $[-\infty, ٢]$ (د) $[-\infty, ٢]$
- ٢) مجال الدالة د (س) = $\frac{س}{س + |س|}$ هو ح - {٣، -٣} فإن :
 (أ) ٣ (ب) $٣ \pm$ (ج) -٣ (د) صفر
- ٣) إذا كانت د : د (س) دالة أحادية وكان : د (٢ + ٣) = د (١ - ٣) فإن :
 (أ) -١ (ب) -٢ (ج) -٣ (د) -٤
- ٤) إذا كانت : د (س) = $\sqrt[٢]{س}$ ، م (س) = $س^٢$ فإن : د (م) =
 (أ) س (ب) $س^٣$ (ج) |س| (د) $\sqrt[٢]{س}$
- ٥) حل المتباينة |س - ٥| ≥ ٧ في ح هي
 (أ) $[-١, ٦]$ (ب) $[-١, ٦]$ (ج) $[-١, ٦]$ (د) $[-١, ٦]$
- ٦) مجال الدالة د (س) = |لو|س| هو
 (أ) $^+ح$ (ب) $^-ح$ (ج) *ح (د) ح
- ٧) إذا كانت : د (س) = $س^٢$ ، د (س) < ١ عندما س ∃
 (أ) $^+ح$ (ب) $^-ح$ (ج) *ح (د) ح - {١}
- ٨) م ، ن جذرا المعادلة : $٣س^٢ - س + ١٢ = ٠$ فإن : لو_٣ م + لو_٣ ن =
 (أ) ٤ (ب) ١٢ (ج) ٢ (د) ١
- ٩) إذا كان : $٢س + ١ = ٢٤$ فإن : $٢س - ٢ =$
 (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٥

١٠ مجال د (س) = لو، -س (س + ٣) هو

(أ) $[-٣، ١]$ (ب) $[-٣، ١]$

(ج) $[-٣، ١] - \{٠\}$ (د) $[-٣، ١]$

١١ د (س) = ٢-س فإن مجموعة حل المعادلة د (س + ١) + د (س - ١) = ٤٠ هي

(أ) $\{٢\}$ (ب) $\{٤\}$ (ج) $\{٨\}$ (د) $\{١٦\}$

١٢ إذا كان لوس (٦ - س) = ٢ فإن : لو (٥ س) =

(أ) ١٠ (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

١٣ مجموعة حل المعادلة : (٢ - س - ٢٥) = $\frac{٤}{٣}$ ٨١ في ح هي

(أ) $\{١ - \}$ (ب) $\{٢٦\}$ (ج) $\{١ - ، ٢٦\}$ (د) $\emptyset$

١٤ نهـا $\frac{٩ - ٢س}{٢(٣ - س)}$ =

(أ) صفر (ب) ٣

(ج) ٩ (د) لا شيء مما سبق.

١٥ نهـا $\frac{١ - قاس}{١ - س}$ =

(أ) ٢ (ب) ١ (ج) صفر (د) ١ -

١٦ نهـا $\frac{١}{٢} \sqrt{٣ - س}$ =

(أ) صفر (ب) ١ (ج) $\sqrt{٣}$ (د) غير موجودة.

١٧ نهـا $\frac{٤ - س - ٤س + ٥}{٣ - ٩س + ٨س^٢} = ٣$ فإن : (٤، ٨) =

(أ) (٢، ٦) (ب) (٢، ٦) (ج) (٣، ٥) (د) (٣، ٥)

١٨ نهـا $\frac{س}{\pi - \pi س} =$

(أ) π (ب) π (ج) $\pi -$ (د) ١

١٩ نهـا $\frac{٢ - ٣ + \sqrt{١ - س}}{١ - س} =$

(أ) ٤ (ب) ٨ (ج) $\frac{١}{٤}$ (د) $\frac{١}{٨}$

٢٠) نهـا ما (٦-س) =
س ← ٢ س - ٤

(أ) ٤ (ب) ٣ (ج) $\frac{٢}{٤}$ (د) $\frac{١}{٤}$

٢١) د (س) = ما ٢ س = متصلة عندما س $\exists$ ح - {س : س = ، $\exists$ ص {

(أ) π (ب) π (ج) $\frac{١}{٢} \pi$ (د) $\frac{١}{٤} \pi$

(أ) π (ب) π (ج) $\frac{١}{٢} \pi$ (د) $\frac{١}{٤} \pi$

٢٢) إذا كان محيط الدائرة المارة برؤوس Δ أ ب ح = ٢π سم

فإن : أ ق + ب ق + ح ق = سم.

(أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ٨

٢٣) المثلث أ ب ح فيه : أ = ١٥ سم ، ح (د) = ٣٠° له حل وحيد

فإن : ب = سم.

(أ) ٨,٥ (ب) ٨ (ج) ٧,٥ (د) ٧

٢٤) في Δ أ ب ح إذا كان : ما = ٢ ما ب ، ب ح = ٦ سم فإن : أ ح = سم

(أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) ٦

٢٥) المثلث أ ب ح فيه : أ = ١٥ سم ، ب ح = ٣٥ سم ، أ ح = ٢١ سم

فإن قياس أكبر زوايا المثلث =

(أ) ١٥٠° (ب) ١٢٠° (ج) ٦٠° (د) ٣٠°

٢٦) إذا كانت : مساحة المثلث أ ب ح = ١٢ سم^٢ فإن : (ب + ح - أ) ط أ =
.....

(أ) ١٢ (ب) ٢٤ (ج) ٤٨ (د) ٩٦

٢٧) في المثلث أ ب ح يكون ما (أ + ب) =

(أ) $\frac{٢٢ - ٢ - ٢}{٢٢}$ (ب) $\frac{٢٢ - ٢ - ٢}{٢٢}$

(ج) $\frac{٢٢ - ٢ - ٢}{٢٢}$ (د) $\frac{٢٢ - ٢ - ٢}{٢٢}$

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الآتيين :

١ إذا كانت د (س) = $\frac{32 - (2 + س)}{س}$ ، $س \neq 0$ ، $س \neq 0$ ، $س = 0$ متصلة عند س = 0 أوجد قيمة : لـ

٢ إذا كانت د (س) = $|س - 3| - 2$ أوجد مداها وفترة التزايد ونوعها من حيث كونها زوجية أم فردية.



إدارة كفر البطيخ
(عام ومنازل)

محافظة دمياط

٧

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد (يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)



اختبار
تفاعلي ٧

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ نقطة رأس منحنى الدالة د : د (س) = $(س + 1) - 3$ هي

- (أ) (٣ ، ١) (ب) (١- ، ٣-) (ج) (١- ، ٣) (د) (١ ، ٣-)

٢ مجال الدالة د (س) = $\sqrt{2 - س}$ هو

- (أ) $[-\infty ، 2]$ (ب) $\{2\}$ (ج) $[-\infty ، 2)$ (د) $[-\infty ، 2]$

٣ مدى الدالة د (س) = $|س - 2|$ يساوى

- (أ) $[0 ، \infty)$ (ب) $[2 ، \infty)$ (ج) $[0 ، \infty]$ (د) $[0 ، \infty]$

٤ في ΔABC يكون $\frac{c}{a} = \frac{4}{3}$ نق حيث نق طول نصف قطر الدائرة

المارة برؤوس ΔABC

- (أ) ٤ (ب) ٨ (ج) $\frac{1}{2}$ (د) $\frac{1}{8}$

٥ نهاية $\lim_{س \rightarrow \infty} (2 + \frac{5}{س}) = \dots\dots\dots$

- (أ) ٢ (ب) ٥ (ج) ٧ (د) ١٠

٦) نهـا = $\frac{٣٢٥}{٢٥}$ س =

(أ) $\frac{٩}{٢٥}$ (ب) $\frac{٣}{٥}$ (ج) ٩ (د) $\frac{٩}{٥}$

٧) إذا تقاطع منحنى الدالتين د (س) ، د^{-١} (س) في النقطة (لـ ، ٢ - لـ) فإن : لـ =

(أ) ٤ (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

٨) قياس أكبر زاوية في المثلث الذى أطوال أضلاعه ٣ سم ، ٥ سم ، ٧ سم تساوى°

(أ) ٦٠ (ب) ٩٠ (ج) ١٢٠ (د) ١٥٠

٩) نهـا = $\frac{١ - س}{١ - س}$ =

(أ) ١ (ب) ٥ (ج) ٦ (د) ٦ -

١٠) لوـس ص + لوـس ص = =

(أ) س ص (ب) س + ص (ج) صفر (د) ١

١١) إذا كانت : د (س) = ٤ - س^{-١} فإن : د (س + ١) =

(أ) ٤ س (ب) ٤ س + ١ (ج) ٤ س + ٢ (د) ٢ س

١٢) نهـا = $\frac{٩ - س}{٣ - س}$ =

(أ) صفر (ب) ٦ (ج) ٦ - (د) ٩

١٣) إذا كان : س = $\frac{٢}{٣}$ ٨ فإن : س =

(أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ٨ (د) ٩

١٤) إذا كان : لو (س + ١١) = ٢ فإن : س =

(أ) ٩ - (ب) ٢٢ (ج) ٨٩ (د) ٩١

١٥) المعادلة س^٢ = ٤ عدد جذورها يساوى

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

١٦) عدد الحلول الممكنة للمثلث ٤ ح حيث $\angle = ٣٠^\circ$ ، $\angle = ٦$ سم ، $\angle = ٨$ سم يساوى

(أ) صفر (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ١

١٧ إذا كانت د دالة زوجية وكان منحنى الدالة يمر بالنقطة $(-3, 2, 1 + m)$

وكانت د $(3) = 5$ فإن $m = \dots$

(أ) صفر (ب) ١ (ج) -١ (د) ٢

١٨ إذا كانت د $(س) = س^2 + 6$ ، $س = 3$ فإن : د $(س) = (3) = \dots$

(أ) ٧٥ (ب) ٨٧ (ج) ٩٠ (د) ١٠٠

١٩ Δ ٢ ح فيه : $\frac{٢}{٥} = \frac{٢}{٥} = \frac{٢}{٥}$ فإن : ٤ : ٥ : ٣ = ح : ح : ح = $\dots$

(أ) ٨ : ٥ : ٦ (ب) ٦ : ٥ : ٨ (ج) ٤ : ٢ : ٧ (د) ٤ : ٥ : ٣

٢٠ نه $\frac{٢}{٥} = \frac{٢}{٥} = \frac{٢}{٥}$ فإن : ح : ح : ح = $\dots$

(أ) ١ (ب) $\frac{\pi}{٤}$ (ج) $\frac{٤}{\pi}$ (د) $\frac{\pi}{٢}$

٢١ في Δ س ص ع إذا كان : س = ص فإن : ح : ح : ح = $\dots$

(أ) $\frac{٢}{٥}$ (ب) $\frac{٢}{٥}$ (ج) $\frac{٢}{٥}$ (د) $\frac{٢}{٥}$

٢٢ في الشكل المقابل :


نه $\frac{٢}{٥} = \frac{٢}{٥} = \frac{٢}{٥}$ فإن : ح : ح : ح = $\dots$

(أ) غير موجودة.

(ب) ١

(ج) -١

(د) ٢



٢٣ معادلة محور التماثل لمنحنى الدالتين د ، س حيث د $(س) = 3س$

، س $(س) = \left(\frac{1}{3}\right)س$ هي $\dots$

(أ) س = ٠ (ب) ص = ٠ (ج) ص = س (د) ص = -س

٢٤ إذا كانت د دالة حيث د $(س) = \begin{cases} ٢س & س \geq ١ \\ ٣س - ١ & س < ١ \end{cases}$ متصلة عند س = ١

فإن : ١ = $\dots$

(أ) ١ (ب) ٢ (ج) -١ (د) -٢

٢٥) نهـ = $\frac{\pi}{\pi - \pi} = \frac{\pi}{\pi} = 1$


١ (د)

π (ج)

٢π (ب)

١- (أ)

٢٦) في الشكل المقابل :



٣/٥ (ب)

٤/٣ (د)

٥/٤ (أ)

٤/٥ (ج)

٢٧) إذا كانت $2 \in [0, 8]$ فإن : لو $2 \in \dots$

$[0, \infty[$ (د)

$]\infty, 3]$ (ج)

$[2, \infty[$ (أ)

$[16, 2[$ (ب)

الأسئلة المقالية

ثانيا

أجب عن السؤالين الآتيين :

$1 > 1$ ،

$3 - 2$ ،

$1 < 1$ ،

$2 - 3$ ،

لها نهاية عند $1 = 1$ أوجد : قيمة ٢

٢) أوجد في $\mathbb{C}$ مجموعة حل المتباينة : $2 - 2 - 6 + 9 > 2$



إدارة بيلا
توجيه الرياضيات

محافظة كفر الشيخ

٨

(يسمح باستخدام الآلة الحاسبة)

أسئلة الاختيار من متعدد

أولاً

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) إذا كانت : د (س) = $5 - 2$ ، س (س) = $3 - 2$

فإن : د (س) = (٢) =

١٦ (د)

١١ (ج)


١- (ب)

٤ (أ)



اختبر
تفاعله

- ٢) إذا كان : $5 - s = 2 - s - 7$ فإن : $3 - s = 1 - s$
 (أ) صفر (ب) ٢ (ج) ١ (د) ٣
- ٣) مجموعة حل المعادلة $4 - s - 2 - s = 2 - s$ = صفر
 (أ) {١} (ب) {١، ٢} (ج) {٢} (د) {١-}
- ٤) كل الدوال الآتية زوجية ما عدا
 (أ) د (س) = s (ب) د (س) = s^2
 (ج) د (س) = $s - 1$ (د) د (س) = $|s|$
- ٥) نهـا $\frac{s^2 - 7s + 12}{s - 3} = \dots\dots\dots$
 (أ) ١ (ب) ١- (ج) ٧ (د) ٢-
- ٦) قيمة : لو (مـا) θ + لو (فا) θ = حيث θ زاوية حادة.
 (أ) صفر (ب) ١ (ج) ١- (د) ٢
- ٧) إذا كانت النقطة (س ، $\frac{4}{s}$) نقطة تقاطع منحنى الدالة د والدالة العكسية لها د^{-١} فإن : س =
 (أ) ٢ (ب) $2 \pm$ (ج) ٤ (د) $4 \pm$
- ٨) فى المثلث أ ب ح يكون : مـا (أ + ب) =
 (أ) مـا أ + مـا ب (ب) مـا أ + مـا ب (ج) مـا ح (د) - مـا ح
- ٩) إذا كانت : نهـا $\frac{s^2 + 3s + 2}{s^2 - 5s + 6} = \frac{1}{3}$ فإن : أ =
 (أ) ٣ (ب) ٦ (ج) ٩ (د) ١٢
- ١٠) نهـا $\frac{s^3 + 3s^2 + 2s}{s^2 - 12s} = \dots\dots\dots$
 (أ) ٦ (ب) $\frac{1}{3}$ (ج) $\frac{3}{4}$ (د) $\frac{3}{4}$
- ١١) إذا كان : لو (س + ٦) = ٢ فإن : س $\exists$
 (أ) {١، ٦} (ب) {١، ٦-} (ج) {١-} (د) {٦}
- ١٢) نهـا $\frac{s^2 - 7s + 2}{s^2 + 3s} = \dots\dots\dots$
 (أ) ٢ (ب) ٤ (ج) $\frac{1}{4}$ (د) $\frac{1}{4}$



١٣) في الشكل المقابل الدالة تزايدية في الفترة

(أ) $]-\infty, 0[$

(ب) $]0, 2[$

(ج) $]2, \infty[$

(د) $]0, 4[$

١٤) في المثلث Δ و إذا كان : $\angle \alpha = 60^\circ$ ، $\angle \beta = 30^\circ$ ، $\angle \gamma = 90^\circ$ ، $AB = 10\sqrt{3}$ ، فإن : $AC =$ سم.

(أ) ٦٠

(ب) ١٥

(ج) ٤٥

(د) ٣٠

١٥) إذا كان : $\frac{1}{a} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ ، فإن : $a =$ سم

(أ) ٣

(ب) ٤

(ج) $\frac{3}{4}$

(د) $\frac{4}{3}$

١٦) نه $\frac{32 - (2 + \alpha)^\circ}{\alpha} =$ ←

(أ) ٢٥

(ب) ٦٤

(ج) ٨٠

(د) ١٠٠

١٧) إذا كانت د $(\alpha) = 3\alpha$ فإن قيمة α التي تحقق المعادلة :

$d = (\alpha + 1) - d = 24$ هي ←

(أ) صفر

(ب) ٢

(ج) ٣

(د) ٨

١٨) في المثلث Δ ح فيه : $\angle \alpha = 50^\circ$ ، $\angle \beta = 70^\circ$ ، $\angle \gamma = 90^\circ$ ، فإن : $AC =$ سم لأقرب رقم عشري واحد.

(أ) ٥,٧

(ب) ٧,٦

(ج) ٦,٧

(د) ٧,٥

١٩) مجموعة حل المعادلة : $\log x + \log 5 = 3$ هي ح ←

(أ) $\{32\}$

(ب) $\{5\}$

(ج) $\{15\}$

(د) $\{2\}$

٢٠) في المثلث Δ ح يكون : $\frac{\alpha}{\sin \alpha} = \frac{\beta}{\sin \beta}$ نق.

(أ) ٥

(ب) ١٠

(ج) ١٥

(د) ٢٠

٢١) إذا كان $\log x = 1$ فإن : $\log (x + 7) + \log (x + 2) =$ ←

(أ) ٦

(ب) ٥

(ج) ٤

(د) ٣

٢٢ إذا كانت : د (س) = $\left. \begin{array}{l} 3س + 2س - 4س - 2 \\ 2س + 3 \end{array} \right\}$ عند $س < 3$ عند $س > 3$


وكانت : نهيا د (س) = 16 فإن : $4 + 3 = \dots$
(أ) 4 (ب) 7 (ج) 1- (د) 13

٢٣ مجال الدالة د : د (س) = $\frac{1}{س - 2}$ هو

(أ) $س - 2$ (ب) $س - 1$ (ج) $س$ (د) $س - 2$

٢٤ عدد الحلول الممكنة للمثلث $أ ب ح$ حيث : $أ = ٦٠^\circ$ ، $ب = ٣$ سم
، $أ = ٥$ سم هو

(أ) 1 (ب) 2 (ج) لا يوجد مثلث. (د) عدد لا نهائى.



٢٥ فى الشكل المقابل :

نهيا د (س) =

(أ) 3

(ب) 2

(ج) صفر

(د) غير موجودة.

٢٦ فى المثلث $أ ب ح$ إذا كان : $\frac{أ}{٢} = \frac{ب}{٤}$ فإن : المثلث $أ ب ح$ فيه

(أ) $أ = ٢$ (ب) $أ = ٤$ (ج) $أ = ٢$ (د) $أ = ٤$

٢٧ نهيا : $\frac{2س - 2}{س} = \dots$

(أ) صفر (ب) 1 (ج) 2 (د) 4

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الآتيين :

١ أوجد فى ح مجموعة حل المتباينة : $9 \geq |س - 2|$

٢ إذا كانت الدالة د : د (س) = $\left. \begin{array}{l} 4س - 2س \\ 2س - 2 \end{array} \right\}$ ، $س \geq 2$ ، $س < 2$ ،

متصلة عند $س = 2$ أوجد : قيمة



إدارة الدلتجات
توجيه الرياضيات

محافظة البحيرة

٩

أسئلة الاختيار من متعدد

أولاً



اختبار
تفاعلي ٩

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ لو ٥٠٠ - لو ٥
لو ٥ ص + لو ٥ ص = ص

- (أ) ١٠ (ب) ٥ (ج) ٢ (د) ١

٢ إذا كان : $٣ \sqrt[٥]{٥} \times \sqrt[٥]{٥} = ٢٢٥$ فإن : ص =

- (أ) ٤٩ (ب) ٢٥ (ج) ٣٦ (د) ١٥

٣ إذا كان : $٧ - ص = ٢ - ص + ٤$ فإن : لو ٧ =

- (أ) $\frac{٢ + ص}{٣ - ص}$ (ب) $\frac{٢ - ص}{٣ - ص}$ (ج) $\frac{٣ + ص}{٢ - ص}$ (د) $\frac{٣ - ص}{٢ + ص}$

٤ لو ٩ × لو ٢ = ٩ فإن : ب =

- (أ) ٢ (ب) $\frac{١}{٤}$ (ج) ٤ (د) $\frac{١}{٢}$

٥ إذا كان : $\sqrt[٢]{٤} = \frac{٢}{٤}$ فإن : ص =

- (أ) $٢ \pm$ (ب) ١ (ج) ٣ (د) ٤

٦ إذا كانت : د (س) = ٥ س فإن : د^{-١} + (٢) د^{-١} = (٣)

- (أ) صفر (ب) ١ (ج) ١- (د) ٢٥

٧ مجموعة حل المعادلة : $٣ - ٦ - ٣ = ٠$ في ح هي

- (أ) {٢، ١} (ب) {١} (ج) {٠} (د) {١، ٠}

٨ إذا كان : د (س) = $\frac{٣ س}{٤ + س}$ دالة فردية

فإن : د (٧) + د (٦) + د (٥) + + د (٥) + د (٦) + د (٧) =

- (أ) ٧- (ب) صفر (ج) ١- (د) ٧

٩ إذا كان : د (س) = $٦ + ٣ س$ ، م (س) = ٣ س فإن : (د م) (٣) =

- (أ) ٧٨ (ب) ٣٠ (ج) ٨٧ (د) ٦٠

١٠) مجموعة حل المعادلة : $|س - ٢| - |س| = ١٢$ فى ح هى

- (أ) $\{٢، ٣-\}$ (ب) $\{٤، ٤-\}$ (ج) $\{٤، ٣\}$ (د) $\{٣، ٣-\}$

١١) نقطة التماثل لمنحنى الدالة د : د (س) = $\frac{١}{١-س} + ٢$ هى

- (أ) $(٢، ١-)$ (ب) $(١، ٢-)$ (ج) $(٢-، ١-)$ (د) $(٢، ١)$

١٢) مجال الدالة د : د (س) = $\sqrt{٢-س}$ هو

- (أ) ح (ب) $[٢، \infty -[$ (ج) $[١، ٢- [$ (د) $] \infty، ٢]$

١٣) قياس أكبر زاوية فى المثلث الذى أطوال أضلاعه : ٦ سم ، ١٠ سم ، ١٤ سم

تساوى

- (أ) ١٢٠° (ب) ١٥٠° (ج) ١٣٥° (د) ٩٠°

١٤) عدد حلول Δ ا ب ح الذى فيه : ا = ٧ سم ، ح = ٩ سم ، ب (د ح) = 60°

يساوى

- (أ) ٣ (ب) ٢ (ج) ١ (د) صفر

١٥) Δ ا ب ح فيه : ا = ٦ سم ، ب = ٤ سم ، ح = $\frac{١}{٣}$ فإن : ح = سم

- (أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ٥ (د) ٦

١٦) إذا كان : Δ س ص ع فيه : $\frac{\text{س ص ع}}{\text{ما س ما ص ما ع}} = ٢١٦$ فإن مساحة الدائرة المارة

برؤوسه تساوى π وحدة مربعة.

- (أ) ٣ (ب) ٩ (ج) ٢٧ (د) ١٦

١٧) نه = $\frac{\text{س} - ٢ - \text{س} + ٦ + \text{س} + ٨}{\text{س} - ٢ - \text{س} + ٥ + \text{س} + ٦}$

- (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ١- (د) ٤

١٨) نه = $\frac{\text{س} - ٢ + \text{س} - ٢ + ١ + \text{س} + ٣}{\text{س} - ٢ + \text{س} - ٣ + ٣ + ١ - \text{س}}$

- (أ) $\frac{١}{٢}$ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) $\frac{١}{٣}$

١٩) نه = $\frac{\sqrt{\text{س} - ٩ - ٨}}{\text{س} - ٢} = ٤، ٩، ٤ \exists$ ح فإن : ا =

- (أ) ٦٢ (ب) ٦٢- (ج) ٦٦ (د) ١٤

٢٠) نهـا $\frac{س^3 + س - ١٠}{س - ٢} = \dots\dots\dots$

١٢ (د)

١٣ (ج)

١٤ (ب)

١٥ (أ)

٢١) نهـا $\frac{٢٧ - ٢(٣ + س + ٢)}{س - ٢} = \dots\dots\dots$

٣ (د)

٩ (ج)

١٨ (ب)

٢٧ (أ)

٢٢) نهـا $\frac{طا(س - ١)}{س - ٢} = \dots\dots\dots$

١ (د)

$\frac{١}{٢}$ (ج)

$\frac{١ - س}{٢}$ (ب)

١ - (أ)

٢٣) Δ ٢٤ حـ فيه : $\frac{س - ٤}{س + ٤} = \frac{س - ٤}{س + ٤}$ فإن : $س = (د) \dots\dots\dots$

١٢٠ (د)

٤٥ (ج)

٣٠ (ب)

٦٠ (أ)

٢٤) Δ ٢٤ حـ محيطه ٢٤ سم ، $س = (د) ٣٥$ ، $س = (د) ٤٨$

فإن : $س \approx \dots\dots\dots$ لأقرب سم.

٦ (د)

٩ (ج)

٨ (ب)

٧ (أ)

٢٥) جملة مبلغ ٥٠٠٠ جنيه موضوع فى بنك يعطى فائدة مركبة سنوياً قدرها ٥ %

لمدة ٧ سنوات يساوى لأقرب جنيه.

٨٥٠٠ (د)

٧٠٣٦ (ج)

٥٣٥٠ (ب)

٦٧٥٠ (أ)

٢٦) إذا كانت : $س = (س) = \left\{ \begin{array}{l} ٢ > س ، ٣ + س + ٢ \\ ٢ < س ، س + ٢ \end{array} \right\}$

نهـا $\frac{س - ١}{س - ٢} = (س) = ١ -$ فإن : $(س ، ٢) = \dots\dots\dots$

(٢ ، ٥ -) (د)

(٣ - ، ٢ -) (ج)

(٥ ، ٢ -) (ب)

(٣ ، ٢ -) (أ)

٢٧) إذا كانت : $س = (س) = \left\{ \begin{array}{l} \frac{س - ٤}{س - ١} ، س \neq ١ \\ ٢٤ ، س = ١ \end{array} \right\}$

متصلة عند $س = ١$ فإن : $٢ = \dots\dots\dots$

٢ (د)

صفر (ج)

٤ (ب)

١ (أ)

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الآتيين :

١ أوجد : نهـا $\frac{6س - ٤س}{٨س}$

٢ ارسم الشكل البياني للدالة $د : د(س) = (١ - س)^٣ + ١$ ومن الرسم استنتج مدى الدالة ونوعها من حيث كونها زوجية أو فردية أو غير ذلك.



توجيه الرياضيات

محافظة الفيوم

١٠

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ مجموعة حل المتباينة : $|س - ٢| ≥ ٤$ هي

(أ) $[٦, ٢-]$ (ب) $]-٢, ٦[$

(ج) $]-٢, ٦[$ (د) $]-٢, ٦[$

٢ نهـا $\frac{٨١ - س}{٢٤٣ + س} = \frac{١}{٣}$

(أ) $\frac{٤-}{١٥}$ (ب) $\frac{١٢-}{٥}$ (ج) $\frac{١٢}{٥}$ (د) $\frac{٤}{١٥}$

٣ في $\Delta أ ب ح$ إذا كان : $٣ ح = ٤ ح = ٦ ح$ فإن : ح =

(أ) $\frac{١}{٤}$ (ب) $\frac{١-}{٤}$ (ج) $\frac{٤٣}{٤٨}$ (د) $\frac{١١-}{٢٤}$

٤ مجموعة حل المعادلة : $(لو س) - ٢ - لو س = ٢$ صفر هي

(أ) $\{١٠, ١\}$ (ب) $\{١٠٠, ١\}$

(ج) $\{١٠٠, ١٠\}$ (د) $\{١٠٠, ٠\}$

٥ إذا كانت : $د(س) = ٣ + ٥\sqrt{س - ٥}$ فإن مجال الدالة $د^{-١}(س)$ هو

(أ) $]-٥, \infty[$ (ب) $]-٣, \infty[$

(ج) $]-٥, \infty[$ (د) $]-٣, \infty[$

- ٦ إذا كانت : نهـا $y = \frac{x^2 - (x+2)x + 4}{x-2}$ فإن : $y = 4$
(أ) ٣ (ب) ٤ (ج) ١١ (د) ٣-
- ٧ مجال الدالة $y = \sqrt{x-4}$ هو
(أ) $[-4, \infty)$ (ب) $[-4, \infty]$ (ج) $[-4, \infty)$ (د) $[-4, \infty]$
- ٨ في المثلث ABC إذا كان : $\angle C = 90^\circ$ فإن : $\sin A = \frac{BC}{AB}$
(أ) $\frac{BC}{AB}$ (ب) $\frac{AC}{AB}$ (ج) $\frac{BC}{AC}$ (د) $\frac{AC}{BC}$
- ٩ إذا كانت : نهـا $y = \frac{x^2 - (x+2)x + 4}{x-2}$ فإن : $y = 4$
(أ) ٣ (ب) ٢- (ج) ٥ (د) ١
- ١٠ إذا كان : $3 \text{ لو} + 4 \text{ لو} - \text{لو} = 2$ (لو ٢ + لو ٣) فإن : $\text{لو} =$
(أ) ٦ (ب) $\frac{1}{6}$ (ج) $\frac{1}{3}$ (د) $\frac{1}{6}$
- ١١ في ΔABC يكون : $\angle C = 90^\circ$ (أ) $\sin A = \frac{BC}{AB}$
(أ) $\frac{BC}{AB}$ (ب) $\frac{AC}{AB}$ (ج) $\frac{BC}{AC}$ (د) $\frac{AC}{BC}$
- ١٢ إذا كانت $y = \frac{x^2 - (x+2)x + 4}{x-2}$ دالة فردية فإن قيمة المقدار : $y = \frac{x^2 - (x+2)x + 4}{x-2}$
(أ) ٣ (ب) ٣- (ج) ٥ (د) ٤-
- ١٣ إذا كانت $y = \frac{x^2 - (x+2)x + 4}{x-2}$ دالة فردية فإن : $y = \frac{x^2 - (x+2)x + 4}{x-2}$
(أ) ٣ (ب) ٣- (ج) ٥ (د) ٤-
- ١٤ إذا كان : $12 \text{ سم} = 10 \text{ سم}$ ، $10 \text{ سم} = 70^\circ$ فإن عدد الحلول الممكنة للمثلث ABC هي
(أ) حل واحد. (ب) حلان. (ج) ليس له حل. (د) عدد لا نهائي من الحلول.

١٥) إذا كانت د (س) = ٣ - س فإن مجموعة حل المعادلة : د (س) + د (س + ٢) = ٩٠ هي

- (أ) {٢، ٠} (ب) {٢، ١} (ج) {٢} (د) {١، ٠}

١٦) مساحة سطح المثلث المحصور بين منحنى الدالة د (س) = |س - ٣| ومحور السينات يساوى وحدة مربعة.

- (أ) ٩ (ب) ٦ (ج) ٣ (د) ١٨

١٧) نها $\lim_{س \rightarrow ٥} \frac{٣ - \sqrt{١ - س}}{٢٥ - س} = \dots\dots\dots$

- (أ) ٣٠ (ب) $\frac{١}{٣}$ (ج) $\frac{١}{٥}$ (د) $\frac{١}{٣}$

١٨) مجال الدالة لوس - ١ (س + ٢) هو

- (أ) $[-٢، \infty)$ (ب) $[-١، \infty)$ (ج) $[-١، \infty)$ (د) $[-٢، \infty)$

١٩) إذا كانت : ٣ - س = $\frac{٢}{٣}$ ص = $\frac{٢}{٣}$ ٢٧ فإن : |س + ص| =

- (أ) ٢٤ (ب) ٣٠ (ج) ٣٦ (د) ٤٢

٢٠) نها $\lim_{س \rightarrow ١} \frac{٣ - \frac{٥}{س}}{\frac{٢}{س} + ١} = \dots\dots\dots$

- (أ) ٥ (ب) $\frac{٥}{٣}$ (ج) $\frac{٣}{٢}$ (د) ٣ -

٢١) فى Δ س ص ع إذا كان : ق (د س) = ٦٠° ، ق (د ص) = ٣٠°

، ص = ٤ سم فإن : ع = سم

- (أ) ٦ (ب) $\sqrt[٣]{٤}$ (ج) ٨ (د) $\sqrt[٣]{٨}$

٢٢) إذا كانت : د (س) = ٢ + س + ١ ، م (س) = $\sqrt{٣ + س}$ فإن :

(د م) (٦) =

- (أ) ٤ (ب) ٧ (ج) ١٣ (د) ٣

٢٣) Δ ح ب ق مساحة سطحه $\sqrt[٣]{٢١}$ سم^٢ ، ق = ٦ سم ، ق (د ب) = ٦٠°

فإن : ح = سم

- (أ) ١٤ (ب) ٧ (ج) $\sqrt[٣]{٧}$ (د) $\sqrt[٣]{١٤}$

٢٤ إذا كان : $٥ + س = ٢ + س٧$ فإن : $٣ + س = ٢ + س٧$ =

(د) ٢١

(ج) ١٥

(ب) ١

(أ) صفر

٢٥ الشكل المقابل يمثل د (س)


فإن : د (س) =

(أ) متصلة عند س = ٢

(ب) لها نهاية عند س = ٢

(ج) العبارتان ١ ، ب صحيحتان.

(د) العبارتان ١ ، ب خاطئتان.



٢٦ نهـ ١ س - س ٣ - س ٥ ط ٢ س =
س ٤ + س ٣ ما

(د) ٢

(ج) ١

(ب) ١ -

(أ) ٢ -

٢٧ مجموعة حل المعادلة : لو س = لو س ٣ هي

(د) {٣- ، ٣}

(ج) {٣ ، ١/٣}

(ب) {١/٣}

(أ) {٣}

ثانيًا الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الآتيين :

١ ارسم الشكل البياني للدالة د (س) = $\frac{١}{س-٢} + ٣$ ، ومن الرسم عين مجال الدالة ومداها واطرادها ، هل الدالة زوجية أو فردية أو غير ذلك.

٢ إذا كانت د (س) = $\left. \begin{array}{l} ٣ + س + ٤ \\ (١ + س) م + ٤ \\ ٢ س + ٣ + س + ٧ \end{array} \right\}$ حيث $٢ \leq س$ حيث $١ - \geq س > ٢$ متصلة في ح حيث $١ - > س$ فأوجد قيمة كل من م ، ل



أسئلة الاختيار من متعدد

أولاً

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) الدالة د : د (س) = (س - ١) - ٢ تناقصية في

(أ) $[-\infty, 1]$ (ب) $[-1, \infty]$ (ج) $[-2, \infty]$ (د) $[-1, \infty]$

٢) إذا كانت : د (س) = ٣ - س فإن : د (س) × د (-س) =

(أ) $\frac{1}{3}$ (ب) ١ (ج) ٣ (د) ٩

٣) مجموعة حل المعادلة : |س| + ٧ = ٥ هي

(أ) $\{-2\}$ (ب) $\{12\}$ (ج) $\emptyset$ (د) $\{2\}$

٤) إذا كانت : د (س) = ١ + ٢س ، س (س) = ١ - س

فإن : د (س) (س) = (٢)

(أ) ٢ (ب) صفر (ج) -١ (د) ١

٥) الدالة الأحادية من بين الدوال الآتية هي حيث س ∈ ح

(أ) د (س) = |س + ٧| (ب) د (س) = س + ١

(ج) د (س) = ٢س (د) د (س) = ٣س - ٢

٦) مدى الدالة د (س) = ٢س حيث س ∈ [-٣, ٢] هو

(أ) $[-2, \infty]$ (ب) ح (ج) $[-2, 8]$ (د) $[-2, 27]$

٧) إذا كانت : ٣ - س = ٢ - س = ٣ - س فإن : س =

(أ) ٥ (ب) ٢٥ (ج) ١٢٥ (د) ٢

٨) الدالة العكسية للدالة : ص = ٢ + س - ١ هي

(أ) س = ص + ١ (ب) ص = ٢ + س - ١

(ج) ص = $\frac{1}{2} - س$ (د) ص = $\frac{1}{2} (س - ١)$

٩) إذا كانت : $٥٥ = ٥ \times ٥$ ، $٣٥ = ٣ \div ٥$ ، فإن : $٨١ = ٣ \times ٣$ =

- (أ) ٣ (ب) ١- (ج) ٥ (د) ٩

١٠) مجال الدالة $د(س) = لويس-٣(س-٢)$ هو

- (أ) $٢[٢، \infty)$ (ب) $٢[٢، \infty)$
(ج) $٣[٢، \infty)$ (د) $٤[٢، \infty)$

١١) مجموعة حل المعادلة : $٢٥ - س - ١٠ \times ٥ = ٢٥$ = صفر

- (أ) $\{١\}$ (ب) $\{٢، ١\}$ (ج) $\{١-\}$ (د) $\emptyset$

١٢) نهيا = $\frac{٢-١-س}{٥-س}$

- (أ) $\frac{١}{٤}$ (ب) $\frac{١}{٣}$ (ج) ٢ (د) ٤

١٣) نهيا = $\frac{٦-س-٢}{٣-س}$

- (أ) $\frac{٥}{٣}$ (ب) ٥ (ج) ١ (د) صفر

١٤) نهيا = $\frac{٨١-(٣+س)}{س}$

- (أ) ١٠٨ (ب) ٧٢ (ج) ٣٦ (د) ٣٢٤

١٥) في المثلث $أ-ب-ج$ إذا كان : $أ = ٤$ سم ، $ب = ٥$ سم ، $ج = ٤$ ،

فإن : $ح =$

- (أ) ٤ (ب) ٥ (ج) ٦ (د) ٧

١٦) نهيا = $\frac{٢-٥+س}{١-س}$

- (أ) ٥ (ب) ٧ (ج) ١٠ (د) ١٢

١٧) إذا كانت : نهيا = $\frac{٥+٢(٢-س)}{٣+٢(٢-س)}$ فإن : $٢ =$

- (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٥ (د) ٨

١٨) نهيا = $\frac{٣(س+٢)}{٣(س+٢)}$

- (أ) ٨ (ب) ١٩ (ج) ١٠ (د) ١٤

١٩) نهـا $\frac{س^2 + س^3 - س^4}{س^2 - س^1} = \frac{س}{٢}$ فإن : نهـ =

- (أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ١- (د) ٣-

٢٠) إذا كانت : د (س) = $\left\{ \begin{array}{l} \frac{س^3}{س} ، س < ٠ \\ س^2 + س ، س \geq ٠ \end{array} \right.$

فإن : نهـا د (س) =

- (أ) ٢ (ب) $\frac{٣}{٢}$ (ج) ٤ (د) ٣

٢١) المثلث أ ب ح فيه : ما أ + ما ح = ٤ ما ب ومحيطه ٣٠ سم

فإن : نهـ =

- (أ) ١٠ (ب) ٨ (ج) ٦ (د) ١٤

٢٢) المثلث أ ب ح فيه : ح (د) = ٣٠° ، أ = ٦ سم ، نهـ = ١٢ سم

فإن عدد المثلثات الممكنة =

- (أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

٢٣) إذا كان طول قطر الدائرة الخارجة للمثلث أ ب ح = ٣ سم

فإن : $\frac{أ ب ح}{ما أ ما ب ما ح} = \frac{أ ب ح}{ما أ ما ب ما ح} = \dots\dots\dots$

- (أ) ٢١٦ (ب) ٨ (ج) $\frac{٢٧}{٨}$ (د) ٢٧

٢٤) المثلث أ ب ح فيه : ٣ ما أ = ٦ ما ب = ٤ ما ح

فإن قياس أصغر زاوية في المثلث =

- (أ) ٢٩ (ب) ١٠٤ (ج) ٧٦ (د) ١٥١

٢٥) المثلث أ ب ح فيه : أ = ٨ سم ، ح (د) = ٥٠° ، ح (د) = ٦٠°

فإن مساحة المثلث أ ب ح = سم^٢

- (أ) ٥٦ (ب) ٢٤ (ج) ٢٧ (د) ٤٨

٢٦) مستطيل طولاً بعديه (لو ٤٠ سم ، (لو ٢٥ سم محيطه = سم

(أ) ٤ سم (ب) (لو ٦٥ سم

(ج) ٢ (لو ٦٥ سم (د) ٦ سم

٢٧) أى من الدوال الآتية ليست دالة أسية ؟

(أ) د : د (س) = ٧ - س

(ب) د : د (س) = (٣ - س)

(ج) د : د (س) = ٧ + س

(د) د : د (س) = $\left(\frac{٧}{٨}\right)^{١-س}$

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الآتيين :

١) استخدم منحنى الدالة د حيث د : د (س) = ٢ س لتمثيل الدالة م (س) = - (س - ١) ٢

ومن الرسم عين مدى م وابحث اطرافها ونوعها من حيث كونها زوجية أم فردية أم غير ذلك.

٢) أوجد : نهـا $\frac{٦ - س}{١٦ - س} \sqrt{٨ + س}$



إدارة المنيا
نموذج (أ)

محافظة المنيا

١٢


أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :


١) مجال الدالة د (س) = $\sqrt{٢س + ٩}$ هو

(أ) ح (ب) {٣ ، ٣-} (ج) ح - {٩-} (د) (٣ ، ٣-)


٢) الشكل الذى يمثل منحنى الدالة $y = |x + 2|$ هو




(أ)



(ب)



(ج)



(د)

٣) قياس أكبر زاوية فى المثلث الذى أطوال أضلاعه ٦ سم ، ١٠ سم ، ١٤ سم
يساوى

(أ) ١٣٥°

(ب) ٩٠°

(ج) ١٢٠°

(د) ١٥٠°

٤) نهـا $\frac{س^2 + ٢س + ٤}{س + ١} = \dots\dots\dots$

(أ) ٤

(ب) ٣

(ج) ١

(د) ٢

٥) إذا كان : لوـس = ١٢٥ = ٣ فإن : س =

(أ) ٢٥

(ب) ٤

(ج) ٥

(د) ٦

- ٦) إذا كان : لو م = ٤ = س فإن : لو م $\frac{1}{4}$ =
- (أ) - س (ب) $\frac{1}{4}$ س (ج) $\frac{1}{4}$ س (د) $\frac{1}{4}$ - س
- ٧) نوع الدالة د (س) = ٤ س
(أ) زوجية. (ب) فردية وأحادية.
(ج) لا زوجية ولا فردية. (د) فردية فقط.
- ٨) إذا كانت : د (س) = س + ٤ ، م (س) = س^٢ فإن : (د م) (٣) =
- (أ) ٢٧ (ب) ٩ (ج) ٤٩ (د) ١٣
- ٩) إذا كان : لو ه = ٥ = س ، لو ص = ٣ فإن : لو ١٥٠ =
- (أ) ١٥ س ص (ب) س + ص + ١ (ج) ١٥ (س + ص) (د) ١٠ س ص
- ١٠) نهـ = $\frac{س - ٣}{س - ٣} = \frac{س - ٣}{س - ٣}$
(أ) ٩ (ب) ٣ (ج) ٣- (د) ٩-
- ١١) طول نصف قطر الدائرة الخارجة للمثلث المتساوي الأضلاع الذى طول ضلعه $٨\sqrt{٣}$ سم = سم
(أ) ٧ (ب) ٨ (ج) ٦ (د) ٤
- ١٢) Δ ب ح فيه : ما ب + ما ح = ٤ ، ٢ ومحيط المثلث = ٢٤ سم فإن طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوس المثلث =
- (أ) ٥ (ب) ٦ (ج) ٧ (د) ٨
- ١٣) محور تماثل الدالة : د (س) = (س + ٣)^٢ + ٤ هو
(أ) س = ٤ (ب) س = -٤ (ج) س = ٣ (د) س = -٣
- ١٤) مجموعة حل المعادلة فى ح : لو س + لو (س + ٩) = ١ هى
(أ) {١٠ ، ١} (ب) {١} (ج) {٩} (د) {١ ، ٩}

١٥) نها $\frac{4-s}{4-s+12} = \dots$
 (أ) صفر (ب) ١٦ (ج) ٨- (د) ٨

١٦) ΔABC حفيه : $\angle B = 35^\circ$ ، $\angle C = 55^\circ$ ، $\angle A = 10^\circ$ سم
 فإن طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوسه =
 (أ) ٦ (ب) ٤ (ج) ٥ (د) ٨

١٧) إذا كانت : د (س) = $3-s$ ، فإن قيمة س التي تحقق أن :
 د (س + ١) - د (س - ١) = ٢٤ تساوى
 (أ) ٣ (ب) ٢ (ج) ٢- (د) ١-

١٨) إذا كانت : د (س) = $3-s+2$ فإن : د $1-s = \dots$
 (أ) $2-s$ (ب) $\frac{1}{3}+s$
 (ج) $2+s+\frac{1}{3}$ (د) $\frac{1}{3}-(s-2)$

١٩) مجموعة حل المتباينة : $|s+2| > 6$ فى ح تساوى
 (أ) $[-8, 4]$ (ب) $[-8, 4)$
 (ج) $[-8, 4]$ (د) $[-8, 4)$

٢٠) فى ΔABC إذا كان : $\angle A = 2^\circ$ ، $\angle B = 4^\circ$ ، $\angle C = 16^\circ$ فإن : د (ب) =
 (أ) 120° (ب) 150° (ج) 30° (د) 60°

٢١) إذا كان : نها $\frac{4-s+6}{s+7} = 3$ فإن : قيمة $s+4 = \dots$
 (أ) ٩ (ب) ٣ (ج) ٢ (د) ١٨

٢٢) المساحة المحصورة بين منحنى الدالة د (س) = $4-s$ ومحور السينات =
 وحدة مساحة.

(أ) ١٦ (ب) ٨ (ج) ٣٢ (د) ١٢

٢٣) إذا كان : ل $\frac{2}{3} = 4$ فإن : ل $\frac{2}{3} = \dots$
 (أ) ٦ (ب) $\frac{1}{6}$ (ج) ٥ (د) $\frac{2}{3}$

٢٤) نهيا $\frac{3\text{ ما } 6\text{ ما } 4\text{ ما}}{2\text{ ما}} = \dots\dots\dots$

٩ (د)

١٨ (ج)

١٣ (ب)

٧٢ (أ)

٢٥) الشكل المقابل يمثل

منحنى الدالة د (س)

فإن د (١) + نهيا $\frac{1}{2}$ د (س)


+ نهيا $\frac{1}{2}$ د (س) = $\dots\dots\dots$

٤ (أ)

٦ (ب)

٨ (ج)

١٠ (د)



٢٦) إذا كانت د (س) = $\frac{16 - 2\text{ س}}{4 - \text{س}}$ حيث $\text{س} \neq 4$ فإن قيمة د (٤) التي تجعل الدالة

متصلة عند $\text{س} = 4$ تساوى $\dots\dots\dots$

٨ (د)

٤ (ج)

٤ - (ب)

١) صفر

٢٧) Δ ٢ ح مساحته $49\sqrt{3}$ سم^٢ ، فيه : $4 = 14$ سم ، $\angle$ (د) = 60°

فإن : $\angle$ = $\dots\dots\dots$ سم

١٠ (د)

١٣ (ج)

١٢ (ب)

١٤ (أ)

الأسئلة المقابلة

ثانياً

أجب عن السؤالين الآتيين :

١) ارسم منحنى الدالة $\text{س} (س) = \frac{1}{2 - \text{س}} + 1$ موضعاً المجال والمدى.

٢) إذا كانت د (س) = $\left. \begin{array}{l} \text{س}^2 + 4\text{س} + 1 , \text{س} < 3 \\ \text{س} = 3 , \\ \text{س}^2 + 2\text{س} , \text{س} > 3 \end{array} \right\}$

متصلة عند $\text{س} = 3$ احسب كل من : 4 ، 5



أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) محور تماثل الدالة $d : (س) = (س + ٢)^٢$ هو

(أ) $س = ٢$ (ب) $س = -٢$ (ج) $ص = ٢$ (د) $ص = -٢$

٢) إذا كانت $س = \frac{٢}{٦٤}$ فإن : $س =$

(أ) ٥١٢ (ب) ٤ (ج) ١٦ (د) ٢

٣) إذا كان : $٣س - لو = ٣$ فإن : $س =$

(أ) ٣ (ب) ٩ (ج) ٢٧ (د) ٨١

٤) إذا كانت : $d (س) = \sqrt{س + ٤}$ ، $س (س) = س - ٢$ ،

فإن : $(د \circ س) (س) =$

(أ) $|س|$ (ب) $س$ (ج) $س + ٢$ (د) ٢

٥) نهبا $س \leftarrow \frac{س - ٢ - ٣س - ١٠}{س - ٥} =$

(أ) ١ (ب) ١- (ج) ٧ (د) ٤

٦) نهبا $س \leftarrow \frac{٢س + ٥س}{٢س + ٢} =$

(أ) ١٠ (ب) ٥ (ج) ٢ (د) ١

٧) عدد الحلول الممكنة التي تحقق الشروط الآتية :

Δ أحرفيه : $١٥٠ = (د)$ ، $أ = ٤$ سم ، $ب = ٦$ سم هو

(أ) عدد لا نهائى. (ب) ٢ (ج) ١ (د) صفر

٨) الدالة $d : س \leftarrow ٤س$ فإن : $د^{-١} : س \leftarrow$

(أ) $س -$ (ب) $٤ - س$ (ج) $\frac{١}{٤} س$ (د) $\frac{١}{٤} = س$

٩٠ مجموعة حل المتباينة : $|س - ١| < ١$ صفر في ح هي

(أ) ح - [١ ، ١) (ب) [١ ، ١)

(ج) ح - [١ ، ١) (د) [١ ، ١)

١٠ نها $\frac{١}{س} = |س - ٣| = \dots\dots\dots$

(أ) صفر (ب) ∞ (ج) ١ (د) ٣-

١١ طول قطر الدائرة المارة برؤوس المثلث الذي فيه : ح (د) = ٥٠° ، ح (د) = ٦٥°

، ح - ح = ٦ سم يساوى (لأقرب سم)

(أ) ٤٠ (ب) ٤١ (ج) ٤٢ (د) ٤٣

١٢ Δ أحرف فيه : ح (د) = ٦٠° ، ح (د) = ٤٠° ، ح = $١٢,٩$ سم

فإن : أ = سم

(أ) ٥,٣ (ب) ١١,٣ (ج) ٢٢,٦ (د) ١٢

١٣ نها $\frac{س}{\pi} = \dots\dots\dots$

(أ) صفر (ب) $\pi -$ (ج) π (د) غير موجودة

١٤ Δ أحرف فيه : أ + ح - ح = أ ح فإن : ح $\exists \dots\dots\dots$

(أ) [٢ ، ٢) (ب) [٢ ، ٢) (ج) [٢ ، ٢) (د) [٢ ، ٢)

١٥ إذا كانت : د (س) دالة فردية على [س ، س]

فإن : د (-س) + د (س) =

(أ) ٢ س (ب) غير معرفة. (ج) ٢- س (د) صفر

١٦ إذا كانت : د (س) = لوس (س - ٣) فإن مجالها هو

(أ) [٢ ، ∞) (ب) [٣ ، ∞) (ج) [٠ ، ∞) (د) [٠ ، ∞)

١٧ إذا كانت د : د (س) = $\frac{٣ + س}{٩ + س}$ متصلة على ح فإن : ح $\exists \dots\dots\dots$

(أ) ٦ (ب) ٦- (ج) [٦ ، ٦) (د) [٦ ، ٦)

١٨ نها $\sqrt{s-4} = \dots$

- (أ) صفر (ب) ١ (ج) ∞ (د) غير موجودة.

١٩ إذا كانت : د $(s) = 7s$ فإن : د $(s) \times$ د $(s-7) = \dots$

- (أ) ٧ (ب) $7s$ (ج) $7s$ (د) $7(s+7)$

٢٠ نقطة تقاطع منحنى الدالة : د $(s) = (s-1)^2 - 1$ مع محور الصادات

هى

- (أ) $(-1, 2)$ (ب) $(0, -3)$ (ج) $(0, -2)$ (د) $(1, 2)$

٢١ مثلث أطوال أضلاعه ٦ ، ١٠ ، ١٤ سم فإن قياس أكبر زواياه تساوى

- (أ) ٦٠ (ب) ١٢٠ (ج) ١٣٥ (د) ١٥٠

٢٢ إذا كان منحنى الدالة د $(s) =$ لوم s يمر بالنقطة $(8, 3)$

فإن : د $(4) = \dots$

- (أ) ١ (ب) ٢ (ج) $\frac{1}{4}$ (د) $2-$

٢٣ مثلث متساوى الأضلاع طول ضلعه لو ٨ سم فإن محيطه يساوى

- (أ) لو ٦ (ب) ١ (ج) ٨ (د) ٦

٢٤ نها $\frac{s^2+s+3}{s^3+1} = \dots$

- (أ) $\frac{3}{5}$ (ب) $\frac{3}{4}$ (ج) ٣ (د) $\frac{1}{4}$

٢٥ نها $\frac{(s+3)^0 - 1}{s^2 - 4} = \dots$

- (أ) $\frac{5}{2}$ (ب) $\frac{5}{4}$ (ج) $\frac{5}{8}$ (د) ٥

٢٦ ΔABC حفيه : $\angle C = 2,5$ سم ، $\angle B = 2$ سم ، $\angle A = \frac{2}{5}$

فإن : ΔABC يكون

- (أ) متساوى الساقين. (ب) متساوى الأضلاع.
(ج) قائم الزاوية. (د) قائم الزاوية ومتساوى الساقين.

٢٧ إذا كانت د : د (س) = ٢ - س ، (١ < ٢) تكون د (س) > ١ عندما س ∃


(أ) ح (ب) ح + (ج) ح - (د) ح *

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الآتيين :

١ ارسم الشكل البياني للدالة د : د (س) = $\frac{1}{|س - ١|}$ ومن الرسم ابحث اطرافها واستنتج مداها.

٢ إذا كانت د : د (س) = $\frac{٣ - \sqrt{٢ + س}}{٩ - س}$ حيث نهـ $\frac{٢}{٣} \leftarrow س$ د (س) = لـ حيث ∃ ح فأوجد قيمة : لـ × م



إدارة المنشأة
توجيه الرياضيات

محافظة سوهاج

١٤

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١ إذا كان محيط Δ أ ب ح = ٢٤ سم ، و (د ب) = ٣٠° ، و (د ح) = ٤٨° فإن : ح =

(أ) ٤ ، ٥ سم (ب) ٦ ، ٤ سم (ج) ٥ ، ٤ سم (د) ٧ ، ٢ سم

٢ إذا كان : د (٣) = ٥ ، ٢ = د (١ -) فإن : د (١ -) =

(أ) ٣ (ب) ١١ (ج) ١٥ (د) ٥

٣ مجموعة حل المعادلة : |س - ٢| = ٣ - س في ح هي

(أ) {٠} (ب) {٢} (ج) {٢ -} (د) {٢ ، ٠}

٤ أودع رجل مبلغ ٥٠٠٠ جنيه في أحد البنوك بفائدة سنوية مركبة ٧٪ فإن إجمالي المبلغ والربح بعد ٥ سنوات = جنيه (مقرباً لأقرب عدد صحيح)

(أ) ٧٠٣٦ (ب) ٧٠١٣ (ج) ٧١١٢ (د) ٨٠٠٠



٥) إذا كان : $s^2 - 7s = 13, 4$ فإن : $s \approx \dots\dots\dots$

- (أ) ٢, ٣٢ (ب) ٣, ٢٣ (ج) ٢, ٨٧ (د) ٣, ٧٨

٦) مجموعة حل المعادلة : $s^2 - 10s + 9 = 0$ صفر في ح هي $\dots\dots\dots$

- (أ) $\{0\}$ (ب) $\{2\}$ (ج) $\{2-\}$ (د) $\{2, 0\}$

٧) إذا كان : د (س) = لو (س-٣) س فإن مجال د (س) هو $\dots\dots\dots$

- (أ) $]-\infty, 2]$ (ب) $]-\infty, 2[$ (ج) $]-\infty, 2[- \{4\}$ (د) $]-\infty, 2[- \{4\}$

٨) Δ س ص ع فيه : س = ع فإن : ما ع = $\dots\dots\dots$

- (أ) $\frac{\text{ص}}{\text{س}}$ (ب) $\frac{\text{س}}{2\text{ص}}$ (ج) $\frac{\text{ص}}{\text{س} + \text{ع}}$ (د) $\frac{\text{ص}}{\text{س} + \text{ص}}$

٩) الدالة : د (س) = $s^2 - 4$ تكون تزايدية في الفترة $\dots\dots\dots$

- (أ) $]-\infty, 4[$ (ب) $]-\infty, 0[$ (ج) $]-\infty, 4[$ (د) $]-\infty, 0[$

١٠) نها $\frac{s^2 - 22}{s^2 - 8} = \dots\dots\dots$

- (أ) $\frac{20}{3}$ (ب) $\frac{20}{3}$ (ج) $4-$ (د) 4

١١) نها $\frac{(2-4)s^2 + 6s - 7 + 1}{(2-6)s^2 + 5s - 3} = 3$ فإن : $4 + 7 = \dots\dots\dots$

- (أ) ٧ (ب) ٥ (ج) ٦ (د) ١-

١٢) نها $\frac{s^2 + s - 2}{1 - s} = \dots\dots\dots$

- (أ) ٢ (ب) ٣ (ج) ٤ (د) غير موجودة.

١٣) الدالة د (س) = $\frac{1}{3 + 2 - s}$ مجالها $\dots\dots\dots$

- (أ) $]-\infty, 2]$ (ب) $]-\infty, 2[$ (ج) $]-\infty, 2[- \{11\}$ (د) $]-\infty, 2[- \{11\}$

١٤) إذا كانت د دالة زوجية وكان : $٧ د (س) - ٣ د (-س) = ١٢$

فإن : $د (٥) = \dots\dots\dots$

(١) ١٢ (ب) ٣ (ج) ٥ (د) -٥

١٥) إذا كان : $لوم س + لوم ٣ (س + ٦) = ٣$ فإن : $س = \dots\dots\dots$

(١) ٣ (ب) -٩ (ج) -٣ (د) ٩

١٦) إذا كان : $٢ ما ٣ = ٣ ما ٤ = ٤ ما ح$ فإن : $\frac{ح + ح}{ح + ح} = \dots\dots\dots$

(١) $\frac{١}{٢}$ (ب) $\frac{٧}{٥}$ (ج) $\frac{٧}{١٠}$ (د) ٢

١٧) Δ ب ح فيه : $١٢٠ = (٤ د) °$ ، $١٠ = أ سم$ ، $١٢ = ح سم$

فإن عدد المثلثات التي تحقق ذلك هو $\dots\dots\dots$

(١) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٣

١٨) منحنى الدالة د : $د (س) = (س + ٢)³$ هو صورة المنحنى د (س) = $س³$ بإزاحة

مقدراها وحدتان في اتجاه $\dots\dots\dots$

(١) $\overleftarrow{وس}$ (ب) $\overleftarrow{وس}$ (ج) $\overleftarrow{وص}$ (د) $\overleftarrow{وص}$

١٩) إذا تقاطع منحنى الدالة د مع منحنى الدالة د^{-١} في النقطة $(٩, \frac{٩}{٢})$

فإن : $٩ = \dots\dots\dots$

(١) $٩ \pm$ (ب) ٩ (ج) $٣ \pm$ (د) ٣

٢٠) نهـا $\frac{٢٢ س}{٥ س} = \dots\dots\dots$

(١) $\frac{٢}{٥}$ (ب) $\frac{٤}{٥}$ (ج) $\frac{٤}{٢٥}$ (د) $\frac{٢}{٢٥}$

٢١) $لوس + لوص - لو ع = ٢$ فإن : $س ص ع = \dots\dots\dots$

(١) ٢ (ب) ١٠ (ج) ٢٠ (د) ١٠٠

٢٢) في Δ ب ح يكون : $\frac{أ ٢}{أ ما} = \dots\dots\dots$ نق

(١) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٤

٢٣) Δ متساوي الأضلاع طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوسه ١٠ سم

فإن طول ضلعه =

٣١٢٠ (د)

٣١١٠ (ج)

٢٠ (ب)

١٠ (أ)


٢٤) د (س) = $\begin{cases} 1 + س & \text{عندما } س < 4 \\ 3 - س & \text{عندما } س \geq 4 \end{cases}$ متصلة عند $س = 4$ فإن : ٤ =

٣ (د)

٢ (ج)

١ (ب)

صفر (أ)



٢٥) في الشكل المقابل :

نهـا د (س) =

(أ) غير موجودة.

(ج) ١

٢٦) نهـا د (س) = $\frac{س^2 - ٥س + ٦}{س^2 - ٩}$ =

(ب) $\frac{1}{٤}$

(أ) $\frac{1}{٤}$

(د) $\frac{1}{٤}$

(ج) $\frac{1}{٥}$

٢٧) إذا كانت د (س) متصلة عند $س = ٣$ ، د $(+٣) = ٢$ د $(-٣) = ٢$

فإن : د (٣) =

(د) غير معرفة

(ج) ٣

(ب) ٢

(أ) ١

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الآتيين :

١) ارسم منحنى الدال د (س) = $|س - ١| + ٢$ ومن الرسم أوجد مدى الدالة

وابحث اطرافها.

٢) أوجد : نهـا د (س) = $\frac{س^2 - ٨س + ٣}{س + ١}$



إدارة إدفو
توجيه الرياضيات

محافظة أسوان

١٥

أولاً أسئلة الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة :

١) مجال الدالة $د (س) = \sqrt{3 - س}$ هو

(أ) $س$ (ب) $س - 3$ (ج) $س, 3$ (د) $س - 3, \infty$

٢) إذا كان : $ه (س) = (د \circ س) (س)$ وكان : $د (س) = س + 1$ ، $ه (س) = س^2 + 1$ فإن : $ه (3) = \dots$

(أ) 10 (ب) 11 (ج) 14 (د) 17

٣) الدالة $د (س) = س \cdot س$ دالة

(أ) زوجية. (ب) فردية.

(ج) أحادية. (د) ليست زوجية ولا فردية.

٤) مدى الدالة $د (س) = \frac{س^2 - 2}{س - 1}$ هو

(أ) $س$ (ب) $س - 2$ (ج) $س - 1$ (د) $س - 2$

٥) مجموعة حل المتباينة : $\sqrt{1 - س} \geq 1$ هي

(أ) $\emptyset$ (ب) $س, 2$ (ج) $س - 2, \infty$ (د) $س, 0$

٦) إذا كان : $\sqrt[3]{(س + 10)} = 8$ فإن : $س = \dots$

(أ) 9 (ب) 16 (ج) 36 (د) 64

٧) أودع رجل مبلغ ٤ جنيه فى بنك يعطى عائد ربع سنوى وفائدة مركبة قدرها ٨ %

فإن جملة المبلغ بعد سنة واحدة هو

(أ) ٤ (ب) ٤ (ج) ٤ (د) ٤

(أ) ٤ (ب) ٤ (ج) ٤ (د) ٤

- ٨ مجموعة حل المعادلة : $٢ + س = ٢ + س$ هي
 (أ) $\{٢-\}$ (ب) $\{٤\}$ (ج) $\{٢-، ٤\}$ (د) $\emptyset$
- ٩ الدالة العكسية للدالة د $(س) = \frac{١}{٢} - س$ هي
 (أ) $\frac{١}{٢} - س$ (ب) $٢ + س$ (ج) $٢ - س$ (د) $\frac{١}{٢} - س$
- ١٠ قيمة س التي تحقق لو، لو، لو $(س) = (١ + س) = ٠$ هي
 (أ) ٠ (ب) ٢ (ج) ٦ (د) ٨
- ١١ مجموعة حل المعادلة : لو $(س) = (٦ + س) = ٢$ لو $س$ هي
 (أ) $\{٢، ٣\}$ (ب) $\{٢-، ٣\}$ (ج) $\{٢\}$ (د) $\{٢\}$
- ١٢ إذا كان : لو $س + لو = ٥ = ٢$ فإن : $س =$
 (أ) ٢ (ب) ٥ (ج) ١٠ (د) ٢٠
- ١٣ نقطة تماثل منحنى الدالة د حيث د $(س) = \frac{١}{٣ - س}$ هي
 (أ) $(٠، ٣)$ (ب) $(٠، ٣-)$ (ج) $(٣، ٠)$ (د) $(٣-، ٠)$
- ١٤ نهـ $\frac{٧ - س}{١ + س} = ٥$ فإن : $٩ =$
 (أ) ٥ (ب) ٢٠ (ج) ٧ (د) ٤
- ١٥ نهـ $\frac{١٦ - ٣س}{٤ - ٢س} =$
 (أ) ٢ (ب) ٤ (ج) ٦ (د) ١٦
- ١٦ نهـ $\frac{س + س + س}{س + س + س} =$
 (أ) صفر (ب) ١ (ج) ٢ (د) ٤
- ١٧ نهـ $(٣ - س + ٤ - س + ٢ - س + ١) =$
 (أ) ١ (ب) ٢ (ج) ٣ (د) ٥
- ١٨ إذا كان : نهـ $(س) = ل$ ، نهـ $(س) = م$
 فإن : نهـ $[د (س) + هـ (س)] =$
 (أ) ل (ب) م (ج) ل + م (د) ل × م

١٩ إذا كانت د : د (س) = $\left. \begin{aligned} &\frac{س^2 - 3س - 18}{س + 3} ، س \neq -3 \\ &، س = -3 ، \end{aligned} \right\}$ متصلة عند س = -3

فإن : ل =

(د) -3

(ج) 3

(ب) 1

(أ) -1

٢٠ الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة د (س) وكانت م (س) = |د (س)| فإن :

(١) م (س) متصلة عند س = 2

(٢) نهبا د (س) = 1 ±

(٣) نهبا م (س) = 1

(أ) (١) ، (٢) صح

(ب) (١) ، (٣) صح

(ج) (١) ، (٢) ، (٣) صح

(د) (٢) ، (٣) صح

٢١ نهبا س قنا س =

(أ) 1

(ب) ∞

(ج) -∞

(د) غير موجودة

٢٢ إذا كانت : نق هي طول نصف قطر الدائرة المارة برؤوس المثلث أ ب ح

فإن : 2 نق ما =

(أ) 4

(ب) 2

(ج) 3

(د) 1

٢٣ قياس أكبر زاوية في المثلث الذي أطوال أضلاعه 3 سم ، 5 سم ، 7 سم

يساوى

(أ) 150°

(ب) 120°

(ج) 60°

(د) 30°

٢٤ المثلث أ ب ح الذي فيه : 3 سم ، 4 سم ، 5 سم يكون محيط الدائرة المارة

برؤوسه =

(أ) 3π

(ب) 30π

(ج) 6π

(د) 2π

٢٥ طول قطر الدائرة الخارجة للمثلث $س$ ص ع المتطابق الأضلاع وطول ضلعه ٦ سم هو سم

(أ) $3\sqrt{2}$ (ب) $6\sqrt{3}$ (ج) $3\sqrt{6}$ (د) $4\sqrt{3}$

٢٦ عدد الحلول الممكنة للمثلث ع ص $س$ حيث $و$ (د $س$) = 112° ، $س = 4$ سم ، ص = 7 سم

(أ) حل وحيد. (ب) حلان. (ج) ثلاثة. (د) لا يمكن الحل.

٢٧ خماسى منتظم محيطه ٣٠ سم فإن مساحة سطحه تقريباً تساوى سم^٢

(أ) ٦٢ (ب) ٧٢ (ج) ٨٢ (د) ٩٢

ثانياً الأسئلة المقالية

أجب عن السؤالين الآتيين :

١ ارسم الشكل البيانى للدالة د حيث د (س) = $2 - |س|$ ومن الرسم استنتج المدى وفترات التزايد للدالة.

٢ أوجد قيمة النهاية الآتية إن وجدت (موضحاً خطوات الحل) : $\lim_{س \rightarrow 5} \frac{(س + 2)(س - 6) - 6}{س}$

كيفية طباعة صفحات معينة من ملف معين

مثلا ازاي نطبع الصفحات من صفحة 4 الى صفحة 9

